



avgust ●●●
crop protection



Каталог
продукции

март

2022

ИННОВАЦИЯ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ!

avgust ●●●
crop protection



125 г/л альфа-циперметрина
+ 100 г/л имидаклоприда
+ 50 г/л клотианидина

Вредителей победит Батрайдер!

- Мгновенно определит и уничтожит более 30 вредителей сада и огорода
- Защитит все основные культуры
- Эффективен при любой погоде

dacha.avgust.com

Оглавление

Алфавитный указатель

Рекомендации садоводам

БИО земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы роста

БАУ

Двойная защита

Родентициды

Бытовая химия

Бытовая химия ЭКО

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ФИРМЫ АВГУСТ!

Оглавление

О компании.....	6
Рекомендации садоводам и огородникам.....	7
Серия «Биоземледелие».....	11
Препараты от вредителей (инсектициды).....	35
Препараты от болезней (фунгициды).....	63
Препараты от сорняков (гербициды).....	81
Адьювант.....	95
Комплексные удобрения.....	97
Регуляторы роста растений.....	101
Серия «БАУ».....	106
Серия «Двойная защита».....	110
Препараты от грызунов (родентициды).....	112
Препараты бытовой химии.....	114
Препараты бытовой химии марки ЭКО.....	128

Алфавитный указатель

А		Кротомет Дымовая шашка	119	Ракурс	72
Агрокиллер	82	Кротомет Эко	132	Ревус для картофеля	75
Агрокиллер + Магнум	83	Крысоед Мягкие брикеты	119	Ревус для лука	73
Адюо	96	Кукарача гранулы	120	Ревус для томатов	74
Алиот	36	Кукарача гель	121	Рибав-Экстра	22
Аминозол	13	Кукарача приманка	120	Ростмомент	24
Аминозол для овощей и земляники	12	Кукарача спрей	121	Рэгги	104
Аминозол для орхидей	15	Кукарача Эко гель	133	С	
Б		Кукарача Эко гранулы	134	Садовый вар	76
Батрайдер	37	Кукарача Эко приманка	134	Синклер	77
Биотлин	39	Л		Слизнед Нео	54/126
Биотлин БАУ	107	Лазурит	89	Супер Кэт	113
Бомбер	40/64	Лазурит Т	90	Сэмпай	55
Бордоская жидкость	65	Лазурит Ультра	91	Т	
В		М		Табу	56
Валлар	41	Магнум	92	Табу ТРИО	57
Г		МатринБио	18	Танрек	58
Герольд	42	МатринБио для цветов	19	Танрек от тли	59
Геката	66	Медвед Эко	131	Террадокс	61
Гризли	43	МикроМикс	99	ТиовитДжет	78
Гумат +7 йод	16	Миура	88	Топаз	79
Д		Молетокс	46	Топаз + Биотлин	111
Деймос	86	Мохофф	20	Торнадо Экстра	93
Деймос газон	84	Муравьед	47	Трафик	105
Деймос Гель	85	Муравьед Супер гель	123	Ф	
Деймос + Миура	87	Муравьед Супер гранулы	122	Фитоверм	25
Ж		Муравьед Супер приманка	123	Фитозонт	27
Жукоед	44	Муравьед Эко гель	135	Фитозонт Хвойный	29
З		Муравьед Эко гранулы	135	Фитолавин	30
Здоровая земля	67	Муравьед Эко приманка	136	Фитомицин	31
Змеед Эко	131	Мухоед для лука	49	Х	
И		Мухоед для цветочных растений	48	Хакер	94
Инсекта	125	Мухоед Супер гранулы	124	Ц	
Инсайд	68	Мухоед Супер лента	124	Цветолукс БАУ	108
К		О		Ч	
Кинмикс	45	Ордан	69	Чистоцвет	80
Клещевит	17	Осоед гель	125	Чистоцвет + Биотлин	111
Клещевит Супер	117	П		Чистоцвет БАУ	109
Клещевит Супер спрей	117	Пиноцид	50	Ш	
Клопоед	122	Побелка садовая	70	Шарпей	60
Комароед	118	Почкорост	103	Э	
Комароед Био	133	Провотокс	53	Экогель	33
Комароед Супер	118	Профилактин	51	Я	
Корень Супер	102	Профилактин Био	21	Янтарин	32
Корнепитатель цветы	98	Профилактин Лайт	52		
Кротомет	132	Р			
		Раёк	71		
		Раёк + Алиот	111		
		Раёк + Биотлин	111		

НОВЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ

avgust ●●●
crop protection



5 г/л матрица

Защищает растения – бережет природу!

- Высокоэффективен против широкого спектра вредителей
- Максимальная безопасность при применении на тепличных культурах
- Срок до сбора урожая всего 3 дня

dacha.avgust.com

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ФИРМЫ АВГУСТ!

Оглавление

Алфавитный указатель

Рекомендации садоводам

БИО земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы роста

БАУ

Двойная защита

Родентициды

Бытовая химия

Бытовая химия ЭКО



С нами расти легче.
С нами растёт страна

АО Фирма «Август» – крупнейшая российская компания по разработке и производству химических средств защиты растений, располагающая 60 представительствами в регионах России и 17 дочерними компаниями за рубежом. По версии РБК, **«Август»** входит в рейтинг 500 крупнейших компаний России. Бренд, который в прошлом году отметил свой 30-летний юбилей, без преувеличения является признанным лидером и настоящим символом отрасли, что подтверждается, среди прочего, серьезными исследованиями международных аналитических компаний, в числе которых Kleffmann Group. В 2017 году **«Август»** стал лауреатом национальной премии **«Марка №1 в России»** в категории «Средства защиты растений», что свидетельствует о высочайшем доверии к продукции бренда со стороны отечественного потребителя.

«Август» также обладает серьёзной научной базой. Наши специалисты разработали более 100 новых рецептур и получили более 40 патентов на изобретения.

В 2020 году началась реализация большого проекта компании в подмосковном наукограде Черноголовка, где будет построен крупный современный научный центр. Он позволит осуществлять масштабные исследования по разработке инновационных препаратов и производить сверхэффективные средства защиты растений, опережающие время. Также Центр станет перспективной площадкой для обучения студентов.

В производственную базу компании входят завод **«Август-Вурнары»** в Чувашской Республике, завод **«Август-Бел»** в Республике Беларусь и новый завод **«Август-Алабуга»** в Татарстане, который был запущен в 2019 году. Он стал самой большой производственной площадкой **«Августа»**, его мощность способна обеспечить качественными средствами защиты растений треть рынка страны.

Для дачников России и стран ближнего зарубежья компания **«Август»** производит более 130 видов продукции. Каждый год продуктовая линейка продолжает расширяться за счёт выпуска новых препаратов от вредителей, болезней, сорняков, регуляторов роста. В ТОП продаж входят такие препараты как Лазурит, Жукоед, Профилактин, Бордоская жидкость, Табу и др. Успешно развивается новое направление препаратов бытовой химии «Мир без вредителей». Муравьед Супер, Клещевит Супер и Клопоед уже завоевали доверие потребителей. Также в эту серию входят экологичные препараты маркированные значком «ЭКО». Продукция компании представлена во всех регионах Российской Федерации, а также в Республике Беларусь и Казахстане. Приобрести её можно в известных сетевых магазинах, таких как «ОБИ», «Леруа Мерлен», «Максидом», «Ашан», «Глобус», «Перекрёсток» и др.

Компания **«Август»** гарантирует своим партнёрам высокое качество продукции, подтверждённое стандартами ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, всегда широкий ассортимент препаратов, доступные цены, бесперебойные поставки точно в срок, гибкую систему скидок и рекламную поддержку в центральных и региональных СМИ.

Оглавление

Алфавитный указатель

Рекомендации садоводам

БИО земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы роста

БАУ

Двойная защита

Родентициды

Бытовая химия

Бытовая химия ЭКО

Рекомендации садоводам и огородникам

avgust 
crop protection

Культура	Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки	
 <p>Картофель</p>	Комплексная защита от колорадского жука, проволочника и различных гнилей, антистрессовый эффект, увеличение размера клубней	Табу ТРИО	Обработка клубней перед посадкой	
	Колорадский жук, проволочник	Табу	Обработка клубней перед посадкой или дна борозды во время посадки	
	Колорадский жук, картофельная коровка	Батрайдер, Танрек, Биотлин БАУ, Жукоед, Кинмикс, Фитоверм, Шарпей	Опрыскивание по мере появления вредителей	
	Проволочник	Провотокс, Террадокс	Внесение гранул при посадке	
	Фитофтороз, альтернариоз	Ордан, Раёк, Инсайд, Ревус для картофеля	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней	
	Ризиктониоз, фузариоз, гнили при хранении: фузариозная, фомозная, мокрая бактериальная гниль, альтернариозная гниль	Синклер	Обработка клубней перед посадкой и перед закладкой на хранение	
	Подавление прорастания клубней при хранении	Трафик	Опрыскивание растений за 21-25 дней до сбора урожая	
	Сорняки (амброзия, лебеда, марь, щирица и др.)	Лазурит, Лазурит Ультра	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см	
 <p>Томат, перец, баклажан</p>	Белокрылка, тли, клещи, трипсы, совка, хлопковая совка	Алиот, Батрайдер, Биотлин, Биотлин БАУ, Танрек от тли, Клещевит, Фитоверм, МатринБио	Опрыскивание по мере появления вредителей	
	Фитофтороз, альтернариоз	Инсайд*, Ордан, Раёк, Ревус для томатов	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней	
	Корневые гнили	Фитоминцин	Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – с интервалом 15 дней	
	Бактериальная гниль, чёрная бактериальная пятнистость	Фитоминцин	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней	
	Сорняки (амброзия, лебеда, марь, щирица и др.)	Лазурит Т, Лазурит Ультра	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт или сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт	
	Перерастание рассады томатов и перцев	Рэгги	Опрыскивание рассады в фазе 2-4 листьев, последующие – с интервалом 5-8 дней, полив рассады под корень в фазе 3-4 листьев	
	 <p>Огурец, кабачок, тыква</p>	Белокрылка, тли, клещи, трипсы	Биотлин, Биотлин БАУ, Клещевит, Танрек от тли, Фитоверм, МатринБио	Опрыскивание по мере появления вредителей
		Пероноспороз (ложная мучнистая роса), антракноз, пятнистости	Ордан	Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания, повторное – через 7-14 дней
Корневые гнили		Фитоминцин	Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – с интервалом 15 дней	
 <p>Капуста</p>	Листогрызущие гусеницы (капустная белянка, совка, моль), тли, блошки	Алиот, Батрайдер, Герольд, Кинмикс, Сэмпай, Фитоверм, Шарпей	Опрыскивание по мере появления вредителей	
	Капустная муха	Мухоед, Террадокс	Рассев гранул вокруг растений после посадки в период массовой яйцекладки	
	Слизни, улитки	Слизнеед Нео	Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках	
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Миура	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние)	
	Перерастание рассады	Рэгги	Полив рассады под корень в фазе семядольных листьев, последующие с интервалом 7 дней	

* находится в стадии регистрации

Оглавление

Алфавитный указатель

Рекомендации садоводам

БИО земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы роста

БАУ

Двойная защита

Родентициды

Бытовая химия

Бытовая химия ЭКО

Культура	Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки
 Морковь	Муха морковная, листоблошки	Шарпей	Опрыскивание в период вегетации
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Миура	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние)
	Слизни, улитки	Слизнеед Нео	Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
 Лук, чеснок	Луковая муха	Табу	Обработка лука-севка перед посадкой
	Пероноспороз (ложная мучнистая роса)	Мухоед, Террадокс	Внесение гранул в почву при посадке луковиц
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Ревус для лука, Инсайд	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Миура	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние)
	Подавление прорастания луковиц при хранении	Трафик	Опрыскивание растений за 14-21 день до сбора урожая
 Яблоня, груша	Предохранение коры от повреждений	Садовая побелка Садовый вар	Обработка стволов осенью или весной до распускания почек Применение после обрезки
	Зимующие стадии медяниц, тлей, листовёрток, щитовок, клещей	Профилактин Био, Профилактин Лайт	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 °С
	Калифорнийская щитовка	Батрайдер	Опрыскивание в период вегетации
	Яблонный цветоед, медяницы, тли	Алиот, Батрайдер, Биотлин, Кинмикс, Танрек от тли, МатринБио	Опрыскивание во время фазы набухания почек, далее – по мере необходимости
	Листовёртки, моли, шелкопряд	Алиот, Герольд, Кинмикс, Сэмпай, Фитоверм, Шарпей	Опрыскивание во время начала появления гусениц
	Плодожорка	Алиот, Герольд, Кинмикс, Сэмпай, Фитоверм, Шарпей	Опрыскивание через 10-15 дней после цветения с последующей обработкой через 2 недели
	Клещи	Клещевит, Фитоверм, МатринБио	Опрыскивание при появлении вредителей
	Парша, мучнистая роса, пятнистости	Геката, Раёк, Тиовит Джет	Опрыскивание: 1-е – в фазе «розовый бутон», 2-е – после цветения, последующие – при необходимости с интервалом 10-14 дней
	Пятнистости, парша, монилиоз	Бордоская жидкость	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса», последующие – в период вегетации
	Монилиоз, бактериальный ожог	Фитомисин	Опрыскивание в период вегетации в фазе обособления бутонов, цветения и далее – по мере необходимости
	Гнили плодов при хранении	Геката	Опрыскивание в период созревания плодов
 Вишня, слива, персик	Предохранение коры от повреждений	Садовая побелка Садовый вар	Обработка стволов осенью или весной до распускания почек Применение после обрезки
	Зимующие стадии медяниц, тлей, листовёрток, щитовок, клещей	Профилактин Био, Профилактин Лайт	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 °С
	Тли, долгоносики, плодожорка	Батрайдер, Кинмикс	Опрыскивание при появлении вредителей
	Вишнёвая муха	Батрайдер	Опрыскивание до или сразу после цветения
	Коккомикоз, монилиоз, пятнистости, плодовая гниль	Бордоская жидкость, Раёк	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса», последующие – в период вегетации
 Неплодоносящие сады	Американская белая бабочка	Молекоск	Опрыскивание по мере появления вредителей
 Смородина, крыжовник	Зимующие стадии медяниц, тлей, листовёрток, щитовок, клещей	Профилактин Био, Профилактин Лайт	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 °С
	Огнёвка, листовёртки, галлицы, пилильщики, клещи, пяденица	Алиот, Батрайдер, Кинмикс, Клещевит, Фитоверм	Опрыскивание при появлении вредителей
	Тли	Батрайдер, Биотлин, Биотлин БАУ, Танрек от тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая
	Мучнистая роса	Тиовит Джет, Топаз	Опрыскивание до и сразу после цветения
	Антракноз, пятнистости, ржавчина	Бордоская жидкость	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса», последующие – в период вегетации

Культура	Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки
 Земляника, малина	Слизни, улитки	Слизнеед Нео	Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
	Образование усов	Рэги	Опрыскивание в начале фазы бутонизации и через 7 дней после первого опрыскивания
	Стимуляция роста, повышение урожайности	Янтарин	Замачивание корневой системы рассады на 1-2 часа перед высадкой. Подкормка 3-4 раза в течение сезона с интервалом 15-20 дней
 Виноград	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Профилактикн Лайт, Профилактикн Био	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 °С
	Листовёртки, листовая филлоксерра	Алиот, Батрайдер, Шарпей, МатринБио	Опрыскивание в фазе разрыхления соцветий и фазе завязывания ягод
	Трипсы, цикадки, совки, мучнистый червец	МатринБио, Алиот	Опрыскивание при появлении вредителей
	Клещи (войлочный, паутинный и др.)	МатринБио, Алиот, Тиовит Джет	Опрыскивание при появлении вредителей
	Слизни, улитки	Слизнеед Нео	Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
	Оидиум	Тиовит Джет, Геката	Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания
	Чёрная пятнистость, чёрная гниль	Инсайд, Геката	Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации-цветение, 2-е – до смыкания ягод в грозди, далее с интервалом 10-14 дней
	Милдью	Инсайд	Опрыскивание до цветения, далее с интервалом 10-14 дней
 Хвойные растения	Пилильщики, клещи, щитовки, хермесы, тли, ложнощитовки, мучнистые червцы, листовёртки	Алиот, Пиноцид	Опрыскивание при появлении вредителей
	Трипсы	Батрайдер	Опрыскивание при появлении вредителей
	Личинки майского жука	Валлар, Тетрадокс	Обмакивание корней сеянцев (саженцев) перед высадкой. Внесение гранул на глубину 5-10 см через 25-30 дней после высадки растений
	Снежное и обыкновенное шютте, ржавчина	Ракурс	Опрыскивание при первых признаках заболевания
	Стимулирование корнеобразования	Фитозонт хвойный	Обработка черенков и корневой системы саженцев и сеянцев
 Цветочно-декоративные культуры	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Профилактикн Лайт, Профилактикн Био	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 °С
	Тли, клещи, трипсы, пилильщики, белокрылка	Алиот, Батрайдер, Биотлин, Клещевит, МатринБио, Фитоверм, Танрек от тли, Цветолукс БАУ	Опрыскивание при появлении вредителей
	Щитовки, ложнощитовки	Алиот	Опрыскивание при появлении вредителей
	Агатова совка, совка-гамма, пяденицы, боярышница, бражник	Герольд, Алиот	Опрыскивание при появлении вредителей
	Почвообитающие вредители	Мухоед, Тетрадокс	Внесение гранул на поверхность почвы вокруг растений с последующим рыхлением
	Слизни, улитки	Слизнеед Нео	Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
	Ржавчина, мучнистая роса, пятнистости	Ракурс, Топаз, Тиовит Джет, Чистоцвет, Чистоцвет БАУ	Опрыскивание при первых признаках заболевания
	Гнили (фузариоз, пенициллёз и др.)	Здоровая земля	Полив почвы в период вегетации
	«Чёрная ножка»	Здоровая земля	Дезинфекция почвы методом полива после высева семян
	Американская белая бабочка	Молекотс	Опрыскивание при появлении вредителей
 Комнатные растения	Тли, клещи, трипсы, белокрылка	Биотлин, Клещевит, МатринБио, Цветолукс БАУ, Фитоверм	Опрыскивание по мере появления вредителей с интервалом 7-10 дней
	Мучнистая роса, ржавчина, пятнистости	Топаз, Чистоцвет	Опрыскивание при первых признаках заболевания
	«Чёрная ножка»	Здоровая земля	Полив почвы в горшках в период вегетации
 Орхидеи	Стимуляция роста и цветения	Аминозол для орхидей	Подкормка с марта по октябрь каждые 7-10 дней
	Увеличение количества цветоносов, обильное цветение	Почкорост	Нанесение препарата на спящую почку

Другое	Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки
Газон 	Сорняки (осот, ромашка, одуванчик, клевер, щавель, подорожник, горцы и др.)	Деймос для газона, Хакер	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса
		Деймос гель	Точечная обработка поверхности листьев сорняков
	Мхи, лишайники	Мохофф	Опрыскивание засоренных участков с последующим посевом газонной культуры
Многоядные вредители 	Медведка	Гризли, Тетрадокс	Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см в период вегетации
	Личинки майского жука	Медвед ЭКО	Заделка шариков в землю на глубину 3-5 см на расстоянии 50 см друг от друга
		Валлар, Тетрадокс	Обмакивание корней сеянцев (саженцев) перед высадкой. Внесение гранул на глубину 5-10 см через 25-30 дней после высадки растений
	Слизни, улитки	Слизнеед Нео	Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
	Садовые муравьи	Муравьед	Полив путей передвижения муравьёв, отстопок, щелей между плитками
		Тетрадокс	Внесение гранул в муравейник или места скопления муравьёв
	Садовые и домовые муравьи	Муравьед Супер	Раскладка гранул на подложки в местах скопления муравьёв
Осы	Осоед	Нанесение геля на подложки и расстановка в местах скопления и обнаружения ос	
Сорная растительность 	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (марь, осоты, крапива и др.)	Деймос, Магнум	Обработка вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев у однолетних и при высоте в 10-15 см многолетних
	Злостные сорняки	Агрокиллер, Агрокиллер+Магнум, Деймос, Деймос+Миура, Торнадо Экстра	Предпосевная обработка участка, опрыскивание сорняков вдоль дорожек и заборов
	Участки, не предназначенные под посев (посадку) культурных растений (обочины дорог, вдоль изгороди и т. д.)	Агрокиллер, Агрокиллер+Магнум, Деймос, Деймос+Миура, Магнум, Торнадо Экстра	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам
Регуляторы роста, удобрения 	Повышение урожайности, устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, стимулирование роста, повышение продолжительности цветения и декоративных качеств цветочных культур	Аминозол, Гумат+7 Йод, Корнепитатель-Цветы, МикроМикс, Рибав-Экстра, Ростомонт, Экогель, Янтарин, Фитозонт универсальный	Предпосевная обработка, обработка до и после цветения
	Стимулирование корнеобразования	Корень Супер, Рибав-Экстра, Фитозонт хвойный, Экогель	Обработка черенков и корневой системы саженцев и сеянцев
	Предотвращение перерастания, улучшение качества рассады	Рэгги	Опрыскивание или полив растений под корень
Грызуны, кроты, змеи 	Мышевидные грызуны (крысы, мыши, полёвки)	Super-Cat, Крысоед	Раскладка приманок в местах скопления (обитания) вредителей
	Кроты	Кротомет	Раскладка гранул в кротовины
		Кротомет ЭКО	Заделка шариков на глубину 20-25 см на расстоянии 1 м друг от друга
		Кротомет шашка	Заделка дымящей шашки в кротовины
	Змеи	Змеед ЭКО	Раскладка шариков на почву на расстоянии 1 м друг от друга
Пустые погреба, подвалы, теплицы 	Болезни (фузариоз, фомоз и др. гнили)	Бомбер	Фумигация помещений перед закладкой продукции на хранение, теплиц* — перед высадкой рассады
	Вредители (моли, клещи, мокрицы, кивсяки, слизни, муравьи и др.)		

* находится в стадии регистрации



Серия «Биоземледелие»



Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО



АМИНОЗОЛ для ОВОЩЕЙ

Жидкое органическое удобрение с аминокислотами для овощных культур и земляники

- стимулирует процесс роста растений
- повышает урожайность
- улучшает развитие корневой системы
- помогает усваивать питательные вещества целыми «строительными блоками»

Срок годности 2 года
 Объем упаковки 100 мл (флакон)
 Действующее вещество N – 9%, аминокислоты – 55%, P

КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Замачивание семян на 12-24 часа	2 мл /200 мл воды	–	1
	Замачивание корневой системы рассады перед посадкой на 1-2 часа	100 мл/10 л воды	–	1
	Полив под корень при посадке	100 мл/10 л воды	0,05-2 л/растение	1
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ЗЕМЛЯНИКА	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	50 мл/10 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4



АМИНОЗОЛ

Жидкое органическое азотное удобрение из продуктов животного происхождения с полным комплексом аминокислот

- повышает урожайность
- стимулирует рост растений
- защищает от стрессов
- улучшает деление клеток и развитие корневой системы
- помогает усваивать питательные вещества целыми «строительными блоками»

Срок годности 2 года
Объём упаковки 5 мл (пластиковая ампула); 500 мл (флакон)
Действующее вещество N – 9%, аминокислоты – 55%, P



КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Замачивание семян на 12-24 часа, корневой системы рассады перед посадкой на 1-2 часа	5 мл/500 мл воды	–	1
	Полив под корень при посадке	5 мл/500 мл воды	0,05-2 л/растение (зависит от размеров)	1
	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 КАРТОФЕЛЬ	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4



КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Замачивание корневой системы саженцев перед посадкой на 1-2 часа	5 мл/500 мл воды	-	1
	Полив под корень при посадке	5 мл/500 мл воды	0,05-2 л/растение (зависит от размеров)	1
	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	10-20 л/растение (корневая подкормка) 1,5-2 л/10 м² кустарников, 2-10 л/дерево (некорневая подкормка)	3-6
 ЗЕМЛЯНИКА	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ЦВЕТОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Замачивание семян на 12-24 часа. Замачивание корневой системы рассады (саженцев) перед посадкой на 1-2 часа	5 мл/500 мл воды	-	1
	Полив под корень при посадке	5 мл/500 мл воды	0,05-2 л/растение (зависит от размеров)	1
	Подкормка цветочных культур в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ защищённый грунт, ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Подкормка	5 мл/2 л воды	до смачивания земляного кома (корневая подкормка) до равномерного смачивания всей поверхности листьев (некорневая подкормка)	1 раз/7-10 дней (март – октябрь), 1 раз/месяц (ноябрь – февраль)





АМИНОЗОЛ для ОРХИДЕЙ

Жидкое органическое удобрение с аминокислотами для орхидей и других цветочных растений

- способствует продолжительному цветению
- стимулирует процесс роста и выносливость орхидей и других комнатных растений, в т. ч. в стрессовых ситуациях
- улучшает развитие корневой системы

Срок годности 2 года
Объём упаковки 2 x 5 мл (пластиковая ампула)
Действующее вещество N – 9%, аминокислоты – 55%, P

КУЛЬТУРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОРХИДЕИ, ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Подкормка	5 мл/2 л воды	до смачивания земляного кома или 100-200 мл/горшок (зависит от размера) (корневая подкормка) до равномерного смачивания всей поверхности листьев (некорневая подкормка)	1 раз/7-10 дней (март – октябрь), 1 раз/месяц (ноябрь – февраль)





bio
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Гумат®+7 ЙОД

Удобрение на основе гуминовых кислот
для обработки семян и подкормки растений

- увеличивает всхожесть и энергию прорастания семян
- улучшает структуру и повышает плодородие почвы
- обеспечивает получение высоких урожаев
- способствует накоплению плодами питательных веществ и витаминов
- экономично: 10 г препарата на 100 л воды

Срок годности	10 лет
Объем упаковки	25 г (пакет)
Действующее вещество	смесь калиевых и/или натриевых солей гуминовых кислот – 75%, К – 5%, медь – 0,2%, Zn – 0,2%, Mn – 0,17%, I – 0,005%, Mo – 0,018%, Co – 0,02%, Fe – 0,4%, B – 0,2%

КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Предпосевное замачивание семян на 14-24 часа, луковок на 6-8 часов	0,5-1 г/л воды	–	1
	Корневая подкормка в течение периода вегетации с интервалом в 14-15 дней, начиная с фазы появления всходов или высадки рассады	1,5-2 г/10 л воды	4-5 л/1 м ²	3-4
 ЦВЕТОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Предпосевное замачивание семян на 14-24 часа, луковок на 6-8 часов, саженцев на 2-3 часа, черенков на 24 часа	0,5-1 г/л воды	–	1
	Корневая подкормка в течение периода вегетации с интервалом в 7-10 дней, начиная с фазы появления всходов или высадки рассады	1,5-2 г/10 л воды	4-5 л/1 м ²	5-6
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Корневая подкормка в период активного роста с марта по сентябрь: 1 раз в 10-15 дней, с октября по февраль: 1 раз в 1-1,5 месяца	1,5-2 г/10 л воды	100-200 мл/ молодое растение, 1-1,5 л/взрослое	2-3
 ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ	Замачивание черенков на 24 часа, саженцев с открытой корневой системой на 2-3 часа	0,5-1 г/л воды	–	1
	Корневая подкормка осенью или при посадке	3 г/10 л воды	10-50 л/растение	–
	Подкормка в течение периода вегетации с интервалом в 10-15 дней, начиная с фазы возобновления вегетации	1,5-2 г/10 л воды	10-50 л/растение (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м ² кустарников, 2-10 л/дерево (некорневая подкормка)	3-4
 ЗЕМЛЯНИКА	Подкормка с интервалом 10-15 дней в фазу возобновления вегетации и после сбора урожая	0,5-2 г/10 л воды	4-5 л/1 м ² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м ² (некорневая подкормка)	1-2

Подробные рекомендации по применению см. на упаковке





Клещевит®

Биологический препарат для борьбы с клещами на различных культурах

- обладает высокой скоростью воздействия – клещи прекращают питание через 6-8 часов, а их полная гибель наступает через 3-4 дня
- имеет минимальный срок ожидания – плоды можно употреблять в пищу уже через 3 дня после обработки
- не вызывает привыкания у вредителей

Срок годности	2 года
Объём упаковки	4 мл (пластиковая ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	2 г/л аверсектина С, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 СМОРОДИНА	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 1 л/куст	2	3
 ЯБЛОНЯ	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/1 л воды	до 5 л/дерево	2	3
 ОГУРЕЦ, ТОМАТ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН <i>защищённого грунта</i>	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	3	3
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ <i>защищённого грунта</i>	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	3	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ <i>открытого грунта</i>	Паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей	2 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	4	–
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей	2 мл/1 л воды	0,1 л/1 м ²	4	–





НОВИНКА
2022

МатринБио®

Новый биологический препарат для защиты овощных, плодовых культур и винограда от широкого спектра вредителей

- имеет растительное происхождение
- максимальная безопасность при применении на тепличных культурах
- уничтожает разные стадии развития вредителей: яйца, личинки, взрослые особи
- последняя обработка возможна за 3 дня до сбора урожая

Срок годности	2 года
Объем упаковки	45 мл (флакон)
Действующее вещество	5 г/л матрина, ВР

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША, АЙВА	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объема кроны)	3	3
 ВИНОГРАД	Гроздевая листовёртка, войлочный клещ (зудень), паутинный клещ, трипсы, цикадки, совки	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	3	3
 ТОМАТ, ОГУРЕЦ открытого грунта	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/10 л воды	3 л/100 м²	3	3
 ТОМАТ, ОГУРЕЦ защищенного грунта	Тепличная белокрылка, паутинный клещ, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/10 л воды	10 л/100 м²	3	3





МатринБио®

Новый биологический препарат для защиты цветочных культур и комнатных растений от клещей и других вредителей

- имеет растительное происхождение
- максимальная безопасность при применении в квартире
- уничтожает разные стадии развития вредителей: яйца, личинки, взрослые особи

Срок годности 2 года
 Объём упаковки 9 мл (флакон)
 Действующее вещество 5 г/л матрина, ВР

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Паутинный клещ, тли	Опрыскивание при появлении вредителей	1,5 мл/ 1 л воды	50-500 мл/растение <i>(в зависимости от размера)</i>	3	-
 РОЗА защищённого грунта	Паутинный клещ, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	1-1,5 мл/1 л воды	1 л/10 м²	3	-
 РОЗА открытого грунта	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации	1-1,5 мл/1 л воды	1 л/30 м²	3	-





bio
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

НОВИНКА
2022

Мохофф

Биогербицид для борьбы со мхом и нежелательной травянистой растительностью

- уничтожает только те части растения, на которые был нанесен
- обладает высокой скоростью воздействия: 2-3 часа после проведения обработки
- мох «сгорает» в течение одного дня
- быстро разлагается в почве

Срок годности	2 года
Объём упаковки	50 мл (флакон)
Действующее вещество	525 г/л пеларгоновой кислоты, МКЭ

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ГАЗОНЫ	Мхи, лишайники, нежелательная травянистая растительность	Опрыскивание засоренных участков с последующим подсевом газонной культуры	5-10 мл/150 мл воды	150 мл/5 м ²	1





Профилактин® БИО

Комбинированный препарат для защиты плодовых, ягодных, декоративных культур и винограда от широкого спектра зимующих вредителей

- содержит инсектицид растительного происхождения
- уничтожает разные стадии развития вредителей
- действует уже при температуре от +4 °С
- защищает культуры на срок не менее 30 дней

Срок годности 2 года
Объём упаковки 500 мл (флакон)
Действующее вещество 658 г/л вазелинового масла + 2,2 г/л матрина, ВЭ

bio
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

НОВИНКА
2022

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША, АЙВА	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, молей, медяницы, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объёма кроны)	1	–
 ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объёма кроны)	1	–
 ВИНОГРАД	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	–
 СМОРОДИНА	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	–
 КРЫЖОВНИК	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	–
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	–





bio
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Рибав®•Экстра

Природный регулятор роста и корнеобразователь

- содержит уникальный комплекс биологически активных веществ
- обеспечивает 99% укореняемость любых культур
- улучшает приживаемость растений при посадке и пересадке
- омолаживает старые растения
- усиливает ростовые процессы

Срок годности	3 года
Объём упаковки	1 мл (пластиковая ампула)
Действующее вещество	0,00152 г/л L-аланина + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты, P

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 КАРТОФЕЛЬ	Повышение полевой всхожести клубней, ранней и общей урожайности, устойчивости к фитофторозу и вирусным заболеваниям	Предпосадочная обработка клубней	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	1 л/100 кг	1
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	0,1 мл (3 капли)/ 3 л воды	3 л/100 м²	1
 ОГУРЕЦ открытого и защищённого грунта	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	100 мл/100 г	1
		Полив под корень в фазе 3-4 настоящих листьев	1 мл/10 л воды	100 мл/1 растение	1
		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 4-5 настоящих листьев, 2-е – через 2 недели после 1-го опрыскивания, 3-е – перед цветением	0,1 мл (3 капли)/ 10 л воды	4 л/100 м²	3
 ТОМАТ открытого и защищённого грунта	Повышение энергии прорастания и всхожести, увеличение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	100 мл/50 г семян	1
		Замачивание семян перед посевом на 30 минут	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	200 мл/100 г семян	1
 ЛУК РЕПЧАТЫЙ (семена), СВЁКЛА СТОЛОВАЯ	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	200 мл/100 г семян	1
		Полив под корень через 1,5 месяца после посева	1 мл/10 л воды	4-5 л/10 м²	1



КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЛУК РЕПЧАТЫЙ (севок)	Ускорение роста, увеличение урожайности	Замачивание севка перед посевом на 30 минут	0,2 мл (6 капель)/ 2 л воды	2 л/1 кг	1
		Полив под корень через 1,5 месяца после посадки	1 мл/10 л воды	4-5 л/10 м ²	1
 ГОРОХ	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности зелёной массы и семян. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание семян перед посевом на 30 минут	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	100 мл/ 50 г семян	1
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	0,01 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	1
 КАПУСТА	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	100 мл/ 50 г семян	1
		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 настоящих листьев, 2-е – через 2 недели после 1-го опрыскивания, 3-е – в фазе завязывания кочана	0,1 мл (3 капли)/ 10 л воды	4 л/100 м ²	3
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (бегония вечноцветущая, бегония клубневая, тагетес отклонённый, виола гибридная), ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных характеристик растений	Полив растений под корень: 1-й – в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-й – после пикировки рассады	1 мл/10 л воды	4 л/1 м ²	2
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	1 мл/10 л воды	4 л/100 м ²	1
 ВИШНЯ, ГРУША, ЯБЛОНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА, ИРГА, ЖИМОЛОСТЬ, РЯБИНА КРАСНАЯ, АРОНИЯ, МАЛИНА, ЕЖЕВИКА, СИРЕНЬ, МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЙ ГИБРИД	Стимулирование корнеобразования, активизация ростовых процессов	Полив при посадке	1 мл/10 л воды	1-5 л/растение	1
		Замачивание зелёных черенков или корневой системы саженцев на 18 часов	1 мл/10 л воды	1 л/ 100 черенков	1
 Ель (сеянцы)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста	0,2 мл (6 капель)/ 1 л воды	3 л/1 м ²	1
		Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива	1 мл/1 л воды	6 л/100 м ²	1
		Замачивание семян перед посевом на 18 часов	1 мл/ 1 л воды	200 мл/ 100 г семян	1
 СОСНА (сеянцы)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста	0,2 мл (6 капель)/ 1 л воды	3 л/1 м ²	1
		Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива	1 мл/1 л воды	6 л/100 м ²	1
		Замачивание семян перед посевом на 18 часов	0,2 мл (6 капель)/ 1 л воды	200 мл/ 100 г семян	1



Ростмомент

Уникальное органическое удобрение с комплексом аминокислот и микроэлементов для подкормки различных культур

- увеличивает урожайность
- ускоряет развитие и рост плодовых, ягодных и овощных культур
- повышает защитные функции растений к неблагоприятным погодным условиям (возвратные заморозки, засуха и др.)

Срок годности	2,5 года
Объём упаковки	100 г (пакет)
Действующее вещество	аминокислоты – 11,1 %, N – 4,55, P – 0,05%, Mg – 0,07% + микроэлементы

КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Подкормка растений в фазе полных всходов или после высадки рассады и далее с интервалом 10-15 дней	5-10 г/10 л воды	5-10 л/10 м² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	2-3
 КАРТОФЕЛЬ	Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее с интервалом 15-20 дней	2-4 г/10 л воды	5-10 л/10 м² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	2-3
 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее с интервалом 15-20 дней	10-15 г/10 л воды	1,5-2 л/10 м² кустарников, 2-10 л/дереву	2-3





Фитоверм®

Биопрепарат для борьбы с комплексом вредителей на различных культурах

- высокая скорость воздействия – насекомые прекращают питание уже через 6-8 часов, полная гибель вредителей наступает через 3-4 дня
- применяется также для защиты от клещей
- имеет минимальные сроки до сбора урожая

Срок годности 2 года
Объём упаковки 4 мл (пластиковая ампула); 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество 2 г/л аверсектина С, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 СМОРОДИНА	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 1 л/куст	2	3
	Пяденицы, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/1 л воды	до 1 л/куст	2	3
 ЯБЛОНЯ	Клещи, пяденицы, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/1 л воды	до 5 л/дерево	2	3
	Яблонная плодоярка, совки	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 5 л/дерево	1	3
 КАПУСТА	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	16 мл/4 л воды	до 4 л/100 м ²	2	3
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/4 л воды	до 4 л/100 м ²	3	1



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОГУРЕЦ, ТОМАТ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН защищённого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	2	3
	Персиковая, бахчевая тли	Опрыскивание в период вегетации	8 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	3	3
	Табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	3	3
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ защищённого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	3	–
	Зелёная розанная тля	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	3	–
	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации	8 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	3	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	4	–
	Тли	Опрыскивание в период вегетации	8 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	4	–
	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	4	–
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей	2 мл/1 л воды	0,1 л/1 м ²	4	–
	Тли	Опрыскивание по мере появления вредителей	2 мл/0,25 л воды	0,1 л/1 м ²	4	–
	Трипсы	Опрыскивание по мере появления вредителей	2 мл/0,2 л воды	0,1 л/1 м ²	4	–





Фитозонт® УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальный природный регулятор роста растений

- повышает энергию прорастания семян и приживаемость рассады
- улучшает цветение
- ускоряет рост и развитие растений
- увеличивает урожайность

Срок годности	3 года
Объём упаковки	1 мл (ампула)
Действующее вещество	0,00152 г/л L-аланина + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты, Р

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 КАРТОФЕЛЬ	Повышение полевой всхожести клубней, ранней и общей урожайности, устойчивости к фитофторозу и вирусным заболеваниям	Предпосадочная обработка клубней	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	1 л/100 кг	1
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	0,1 мл (3 капли)/ 3 л воды	3 л/100 м²	1
 ОГУРЕЦ <i>открытого и защищённого грунта</i>	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 мин.	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	100 мл/100 г	1
		Полив под корень в фазе 3-4 настоящих листьев	1 мл/10 л воды	100 мл/ 1 растение	1
		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 4-5 настоящих листьев, 2-е – через 2 недели после 1-го опрыскивания, 3-е – перед цветением	0,1 мл (3 капли)/ 10 л воды	4 л/100 м²	3
 ТОМАТ <i>открытого и защищённого грунта</i>	Повышение энергии прорастания и всхожести, увеличение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 мин.	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	100 мл/ 50 г семян	1
 СВЁКЛА СТОЛОВАЯ, ЛУК РЕПЧАТЫЙ (семена)	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 мин.	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	200 мл/ 100 г семян	1
		Полив под корень через 1,5 месяца после посева	1 мл/10 л воды	4-5 л/10 м²	1



КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЛУК РЕПЧАТЫЙ (севок)	Ускорение роста, увеличение урожайности	Замачивание севка перед посевом на 30 мин.	0,2 мл (6 капель)/ 2 л воды	2 л/1 кг	1
		Полив под корень через 1,5 месяца после посадки	1 мл/10 л воды	4-5 л/10 м²	1
 КАПУСТА	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 мин.	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	100 мл/ 50 г семян	1
		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 настоящих листьев, 2-е – через 2 недели после 1-го опрыскивания, 3-е – в фазе завязывания кочана	0,1 мл (3 капли)/ 10 л воды	4 л/100 м²	3
 ГОРОХ	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности зелёной массы и семян. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание семян перед посевом на 30 мин.	0,1 мл (3 капли)/ 1 л воды	100 мл/ 50 г семян	1
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	0,1 мл (3 капли)/ 3 л воды	3 л/100 м²	1
 ВИШНЯ, ГРУША, ЯБЛОНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА, ЖИМОЛОСТЬ, РЯБИНА КРАСНАЯ, АРОНИЯ, МАЛИНА, ЕЖЕВИКА, МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЙ ГИБРИД, ИРГА	Стимулирование корнеобразования, активизация ростовых процессов	Замачивание зеленых черенков или корневой системы саженцев на 18 ч.	1 мл/10 л воды	1 л/ 100 черенков	1
		Полив при посадке	1 мл/10 л воды	1-5 л/растение	1
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (бегония вечноцветущая, бегония клубневая, тагетес отклонённый, виола гибридная)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных характеристик растений	Полив растений под корень: 1-й – в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-й – после пикировки рассады	1 мл/10 л воды	4 л/1 м²	2
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	1 мл/10 л воды	4 л/100 м²	1
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (сирень и др.)	Стимулирование корнеобразования	Замачивание зеленых черенков или корневой системы саженцев на 18 ч.	1 мл/10 л воды	1 л/ 100 черенков	1
		Полив при посадке	1 мл/10 л воды	1-5 л/растение	1





Фитозонт® ХВОЙНЫЙ

Специализированный высокоэффективный природный укоренитель

- обеспечивает 99% укореняемость хвойных культур
- улучшает приживаемость при посадке и пересадке
- усиливает ростовые процессы

Срок годности	3 года
Объём упаковки	1 мл (пластиковая ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	0,00152 г/л L-аланина + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты, P

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЕЛЬ	Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста	0,2 мл (6 капель)/1 л воды	3 л/1 м²	1
		Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива	1 мл/1 л воды	6 л/100 м²	1
 СОСНА	Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста	0,2 мл (6 капель)/1 л воды	3 л/1 м²	1
		Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива	1 мл/1 л воды	6 л/100 м²	1





Фитолавин®

Биологический препарат для борьбы с бактериальными и грибными болезнями плодовых и овощных культур

- гарантирует получение экологически чистой безопасной для здоровья продукции
- эффективен против корневых гнилей, монилиоза, бактериозов, пятнистостей и др.
- можно применять за 2 дня до сбора урожая

Срок годности	1 год
Объём упаковки	50 мл (флакон)
Действующее вещество	БА 120 000 ЕА/мл, 32 г/л фитобактериомицина – комплекс стрептотрициновых антибиотиков, ВРК



КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Бактериальный ожог, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы обособления бутонов, цветения, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром до 4-5 см	20 мл/10 л воды	2-5 л/дерево	4	2
 ТОМАТ <i>защищённого грунта</i>	Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля	Полив рассады под корень 0,2% концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней	20 мл/10 л воды	30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/растение (на постоянном месте)	2	2
 ТОМАТ <i>открытого грунта</i>	Бактериальная вершинная гниль, альтернариоз, чёрная бактериальная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней	20 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	2	-
 ОГУРЕЦ <i>защищённого грунта</i>	Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное и трахеомикозное увядание	Полив рассады под корень 0,2% концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней	20 мл/10 л воды	30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/растение (на постоянном месте)	2	2
	Угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации через 7-10 дней после высадки растений на постоянное место, последующие – с интервалом 2-3 недели	20 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1-2	2





bio
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Фитомицин®

Биологический препарат для борьбы с корневыми гнилями

- аналог природного антибиотика, выделенного из почвенных бактерий
- защищает от бактериальных и грибных болезней томаты, огурцы, а также плодовые культуры
- гарантирует получение экологически чистой безопасной для здоровья человека продукции

Срок годности	1 год
Объём упаковки	4 мл (пластиковая ампула)
Действующее вещество	БА 120 000 ЕА/мл, 32 г/л фитобактериомицина – комплекс стрептотрициновых антибиотиков, ВРК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТ открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, альтернариоз, чёрная бактериальная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней	20 мл/10 л воды	10 л/100 м²	2	–
 ТОМАТ защищённого грунта	Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля	Полив рассады под корень 0,2% концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней	20 мл/10 л воды	30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/растение (на постоянном месте)	2	2
 ОГУРЕЦ защищённого грунта	Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное и трахеомикозное увядание	Полив рассады под корень 0,2% концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней	20 мл/10 л воды	30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/растение (на постоянном месте)	2	2
	Угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации через 7-10 дней после высадки растений на постоянное место, последующие – с интервалом 2-3 недели	20 мл/10 л воды	10 л/100 м²	1-2	2
 ЯБЛОНЯ	Бактериальный ожог, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы обособления бутонов, цветения, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром до 4-5 см	20 мл/10 л воды	2-5 л/дерево	4	2





Янтарин®

Природный регулятор роста плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур

- ускоряет сроки цветения и созревания
- увеличивает урожайность, улучшает качество продукции
- повышает устойчивость растений к поражению болезнями
- обладает антистрессовыми свойствами, оказывая положительное действие на растения в условиях засухи, жары, заморозков, излишней влажности
- улучшает усвоение питательных веществ из почвы

Срок годности	2 года
Объём упаковки	100 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество	5 г/л янтарной кислоты, ВРК



КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЗЕМЛЯНИКА	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период массового цветения	50 мл/ 4 л воды	4 л/100 м²	1	-
 ВИНОГРАД	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации	130 мл/ 10 л воды	10 л/100 м²	1	-
 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период массового цветения	50 мл/ 10 л воды	10 л/100 м²	1	-
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (однолетние)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных и декоративных характеристик растений	Полив под корень: 1-й – в фазе 2-х настоящих листьев, 2-й, 3-й и 4-й – с интервалом 20 дней	15 мл/ 10 л воды	10 л/1 м²	4	-
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (многолетние)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных и декоративных характеристик растений	Полив под корень: 1-й – весной в фазе возобновления вегетации, 2-й и 3-й – с интервалом 20 дней	30 мл/ 10 л воды	10 л/1 м²	3	-





Экогель®

Полифункциональный активатор роста, цветения, болезнеустойчивости и урожайности различных культур

- способствует ускоренному плодоношению
- улучшает внешний вид декоративных культур
- ускоряет акклиматизацию и приживаемость «импортных» растений
- повышает устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды

Срок годности 2 года
Объем упаковки 50 мл (флакон)
Действующее вещество 30 г/л лактата хитозана, ВР




КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
КАРТОФЕЛЬ	Повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление роста, развития, увеличение урожайности	Обработка клубней перед посадкой	25 мл/1 л воды	1 л/100 кг	1	-
		Опрыскивание в период бутонизации и начала цветения	30 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1	-
ТОМАТ, ОГУРЕЦ	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки, устойчивости к неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 12 часов	2,5 мл/100 мл воды	100 мл/100 г семян	1	-
		Опрыскивание за 7 дней до высадки рассады в грунт, через 7 дней после пересадки и последующие обработки с интервалом 14 дней	40 мл/4 л воды	4 л/100 м²	4	-
ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ	Повышение устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды, к болезням, улучшение интенсивности кущения травостоя	Полив растений в фазе кущения и далее 2 раза с интервалом 30 дней	1 мл/1 л воды	7 л/1 м²	3	-
		Опрыскивание растений через 2 недели после каждого полива	10 мл/1 л воды	1 л/10 м²	3	-



КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 РОЗА	Активация роста и развития корневой системы, повышение устойчивости к болезням	Полив при пересадке или через 2 недели после распускания почек и через 30 дней после первого полива	10 мл/ 1 л воды	0,5 л/растение	2	-
		Опрыскивание растений в течение периода вегетации начиная с фазы появления первых листьев с интервалом 14 дней	10 мл/ 1 л воды	8-15 л/100 м ²	8	-
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ	Повышение приживаемости, устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды, к болезням, улучшение декоративных качеств	Полив растений после высадки или в начале возобновления вегетации	15 мл/ 1 л воды	10 л/растение	1	-
		Опрыскивание растений в течение вегетационного периода – в начале возобновления вегетации и далее 2 раза с интервалом 30 дней	1 мл/ 1 л воды	1-20 л/растение	3	-
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (открытый грунт)	Повышение устойчивости к болезням, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений в течение периода вегетации начиная с фазы появления первых листьев с интервалом 14 дней	10 мл/ 1 л воды	10 л/100 м ²	4-8	-
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (рассада)	Активация роста и развития корневой системы, повышение устойчивости к болезням, улучшение декоративных качеств	Полив растений после пикировки или в фазе 2-4 листьев	20 мл/ 1 л воды	3 л/1 м ²	1	-
		Опрыскивание растений через 10-14 дней после полива и далее 3 раза с интервалом 10-14 дней	10 мл/ 1 л воды	4-4,5 л/100 м ²	4	-
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (горшечные растения)	Активация роста и развития корневой системы, повышение устойчивости к болезням, улучшение декоративных качеств	Полив растений при пересадке и через 30 дней после первого полива	25 мл/ 1 л воды	50-500 мл/растение	2	-
		Опрыскивание растений в течение всей вегетации с интервалом 14 дней	10 мл/ 1 л воды	до увлажнения всей поверхности листьев	8	-





Препараты от вредителей

ИНСЕКТИЦИДЫ

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО



Алиот

Препарат широкого спектра действия против различных вредителей

- обладает тройным действием – контактным, кишечным и частично фумигационным
- уничтожает сосущих, грызущих вредных насекомых и клещей
- применяется на овощных, плодовых, ягодных, цветочных, декоративных культурах и винограде

Срок годности 2 года
Объём упаковки 5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 570 г/л малатиона, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАПУСТА	Белянки, капустная совка, капустная моль, тли, мухи	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/5 л воды	до 5 л/100 м ²	1	21
 ТОМАТ открытого грунта	Тли, клещи	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/5 л воды	до 5 л/100 м ²	2	21
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодовая жорка, тли, листовёртки, медяница	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	до 3 л/дерево (зависит от возраста и сорта дерева)	2	21
 ВИНОГРАД	Гроздевая листовёртка, клещи	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	до 1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	2	21
 СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ	Сморodinный почковый клещ	Опрыскивание в период бутонизации	10 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	2	21
	Листовёртки, щитовки, тли, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	2	21
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Боярышница, тли, листоеды, пилильщики, паутинные клещи, щитовки, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	2	-
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Табачный трипс, тли, клопы, совки, паутинные клещи, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	до 5 л/100 м ²	2	-





Батрайдер®

Инновационный универсальный препарат от комплекса вредителей

- обладает высокой скоростью воздействия и длительной защитой
- уничтожает 32 вида вредителей
- не имеет аналогов
- применяется на плодовых, ягодных, овощных, цветочных, декоративных культурах и винограде

Срок годности	3 года
Объём упаковки	10 мл (флакон)
Действующее вещество	125 г/л альфа-циперметрина + 100 г/л имидаклоприда + 50 г/л клотианидина, СК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Яблонный цветоед, калифорнийская щитовка, тли	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	1-5 л/дерево <i>(зависит от возраста и объёма кроны)</i>	1	20
 ВИНОГРАД	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст <i>(зависит от возраста и типа формирования куста)</i>	1	20
 ВИШНЯ	Тли, вишнёвая муха, вишнёвый долгоносик	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	1-5 л/дерево <i>(зависит от возраста и объёма кроны)</i>	1	20
 СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ	Тли, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	0,5-1,0 л/куст	1	30



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАПУСТА	Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1	20
 ТОМАТ открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1	20
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1	20
 ЦВЕТочНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1	–
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	1-5 л/дереву <i>(зависит от возраста и объёма кроны)</i>	1	–
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	1	–





Биотлин®

Системный препарат для уничтожения различных видов тли на плодовых, ягодных, овощных и цветочных культурах

- эффективен против насекомых, скрытоживущих и питающихся на нижней стороне листа
- обладает высокой скоростью воздействия – эффект от обработки наблюдается уже через несколько часов
- не вызывает привыкания у вредителей

Срок годности 4 года
Объём упаковки 3 мл, 7 x 1 мл (ампула); 9 мл (флакон)
Действующее вещество 200 г/л имидаклоприда, ВРК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОГУРЦЫ И ТОМАТЫ защищённого грунта	Тли, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	до 30 л/100 м ²	1	3
 ЯБЛОНЯ	Тли	Опрыскивание в период появления вредителей	3 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и сорта дерева)	1	7
	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и сорта дерева)	1	60
 СМОРОДИНА	Тли	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 0,5 до 1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	60
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ защищённого грунта	Тли, цикадки, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1	–





НОВИНКА
2021

Бомбер®

Дымовая шашка для обработки подвалов и погребов от вредителей, гнилей и плесени

- не имеет аналогов, содержит 2 компонента – фунгицид и инсектицид
- активна против болезней (фузариоза, фомоза и др. гнилей), вредителей (картофельной моли, клещей, мокриц, кивсяков, подвальных слизней, муравьев и др.), а также грызунов
- образующийся дым проникает в труднодоступные места

Срок годности 2 года
Объём упаковки 5 г (пакет)
Действующее вещество 300 г/кг тиабендазола + 130 г/кг циперметрина, ДШ

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 <p>ПУСТЫЕ ПОГРЕБА, ПОДВАЛЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ</p>	Возбудители болезней, вредные членистоногие	Фумигация пустых помещений перед закладкой продукции на хранение	5 г (1 шашка)/20 м ³	1
 <p>ПУСТЫЕ ПАРНИКИ И ТЕПЛИЦЫ*</p>	Вредные членистоногие (кивсяки, паутинные клещи, муравьи и др.), возбудители болезней (Aspergillus, Botritis, Cercospora, Fusarium, Foma, Septoria)	Фумигация пустых помещений перед посадкой рассады	5 г (1 шашка)/20 м ³	1

После обработки выдержать помещение закрытым 3 дня, затем проветривать в течение 2 дней.

*находится в стадии регистрации





Валлар®

Первый препарат для защиты от личинок майского жука (хруща) в личных подсобных хозяйствах

- предотвращает гибель молодых деревьев
- увеличивает приживаемость саженцев
- эффект проявляется уже через несколько часов после контакта с вредителем

Срок годности 3 года
Объем упаковки 50 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 <p>САЖЕНЦЫ И СЕЯНЦЫ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ, ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР</p>	Личинки майского и других видов хрущей, проволочники и ложнопроволочники	Поверхностное внесение гранул препарата после высадки растений в грунт с последующей заделкой на глубину 5-10 см	40-50 г/10 м ²	2	–





Герольд®

Уникальный препарат от яблонной плодожорки, боярышницы и других вредителей

- нарушает развитие яиц и личинок насекомых
- защищает не менее 14 дней
- активен в отношении гусениц листовёрток, пядениц, бражника, различных совок, молей и др.
- применяется на плодовых, овощных, декоративных и цветочных культурах

Срок годности 3 года
Объём упаковки 5 мл (пластиковая ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 240 г/л дифлубензурина, ВСК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	до 1-5 л/дерево <i>(в зависимости от объёма кроны)</i>	2	40
 СМОРОДИНА	Смородинная почковая моль, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	1	30
 КАПУСТА	Капустная совка, белянки, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	2-4 л/100 м²	1	30
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Пяденицы, боярышница, бражник	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	1	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Агатовая совка, совка-гамма, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	2-4 л/100 м²	1	–





Гризли®

Оригинальный препарат-приманка для защиты картофеля, овощных, цветочных и других культур от медведки

- уничтожает как взрослых насекомых, так и их личинок в течение первых суток после обработки
- удобная в применении гранулированная форма
- специальные вкусовые добавки обеспечивают отличную поедаемость приманки
- гарантирует длительную защиту – не менее трёх недель

Срок годности	2 года
Объём упаковки	100 г (пакет)
Действующее вещество	40 г/кг диазинона, Г

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ <i>(кроме раннеспелых сортов)</i>	Медведка	Внесение гранул в почву при высадке клубней и в период вегетации на глубину 2-5 см	20 г/10 м ²	1	60
 КАПУСТА <i>(кроме раннеспелых сортов)</i>	Медведка	Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см в период высадки рассады, при необходимости повторно через 10-14 дней	20 г/10 м ²	2	60
 ЗЕМЛЯНИКА <i>(после сбора урожая)</i>	Медведка	Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см после сбора урожая	20 г/10 м ²	2	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Медведка	Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см в период вегетации	20 г/10 м ²	2	–





Жукоед®

Уникальный трёхкомпонентный препарат от колорадского жука

- содержит три активных вещества с разными механизмами действия
- воздействует даже на особи, резистентные к одному из компонентов
- высокая активность при различных температурах
- полная гибель насекомых наступает за 24 часа

Срок годности	3 года
Объём упаковки	9 мл (флакон)
Действующее вещество	125 г/л альфа-циперметрина + 100 г/л имидаклоприда + 50 г/л клотианидина, СК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	20





Кинмикс®

Препарат от комплекса вредителей на плодовых, ягодных и овощных культурах

- обладает широким спектром действия, уничтожает различные виды вредных насекомых
- защищает растения на срок до двух недель
- имеет низкие нормы расхода

Срок годности 5 лет
Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 50 г/л бета-циперметрина, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА	Тли	Опрыскивание до и после цветения	2 мл/5 л воды	до 3 л/дерево <i>(зависит от возраста и сорта дерева)</i>	2	30
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодожорка, листовёртки, тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	2 мл/5 л воды	до 5 л/дерево <i>(зависит от возраста и сорта дерева)</i>	2	20
	Яблонная медяница, яблонный цветоед	Опрыскивание в период бутонизации	2 мл/5 л воды	до 3 л/дерево <i>(зависит от возраста и сорта дерева)</i>	2	20
 СМОРОДИНА	Листовёртки, тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	2 мл/5 л воды	0,5-1 л/куст	2	20
 КРЫЖОВНИК	Пилильщики, тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	2 мл/5 л воды	0,5-1 л/куст	2	20
 КАПУСТА	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	2-3 мл/4 л воды	до 4 л/100 м ²	1	20
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	1,5-2 мл/4 л воды	до 4 л/100 м ²	1	20



Молетокс®

Надежная защита от картофельной моли и американской белой бабочки

- действие препарата заметно уже через 30 минут
- полная гибель вредителей наступает за 1,5-2 часа
- защищает растения на срок не менее двух недель
- уничтожает гусениц на любой стадии развития



Срок годности 4 года
 Объем упаковки 10 мл (флакон)
 Действующее вещество 50 г/л эсфенвалерата, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Картофельная моль	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1	7
 НЕПЛОДОНОСЯЩИЕ САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ (саженцы, молодые деревья, не достигшие возраста плодоношения), ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	1-5 л/дерево или куст (зависит от возраста и объема кроны)	1	–





Муравьед®

Современное средство
для защиты приусадебных участков
от различных видов муравьёв

- характеризуется высокой контактно-кишечной активностью
- применяется на приусадебных участках, отмоствах домов, в щелях между садовыми плитками и т. д.

Срок годности	4 года
Объём упаковки	11 мл, 55 мл (флакон)
Действующее вещество	18,3 % имидаклоприда

ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА
 Черные садовые и другие виды синантропных муравьёв	Обработка путей проникновения насекомых в помещения – вдоль порогов, по периметру отмостки строений, щели между садовыми плитками и т. д.	5,5 мл/1 л воды	50-100 мл/1 м ²





Мухоед®

Незаменимое средство для борьбы с почвенными вредителями на цветочных растениях

- удобен в применении – препарат полностью готов для внесения в почву
- уничтожает личинок и взрослых насекомых
- гранулы препарата равномерно распределяются в почве и постепенно выделяют действующее вещество
- не оказывает отрицательного влияния на растения

Срок годности	3 года
Объём упаковки	10 г (пакет)
Действующее вещество	40 г/кг диазинона, Г

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ <i>(кроме горшечных)</i>	Почвенные комарки, бороздчатый долгоносик	Внесение на поверхность почвы вокруг растений с последующей заделкой путём рыхления почвы	2-3 г/1 м ²	1

Примечание: 1 чайная ложка препарата соответствует 5 г





Мухоед®

Высокоэффективное средство для борьбы с почвенными вредителями на овощных культурах

- удобен в применении – препарат полностью готов для внесения в почву
- уничтожает личинки и взрослых насекомых
- быстро разлагается и не накапливается в почве
- не оказывает отрицательного влияния на растения

Срок годности 3 года
Объём упаковки 25 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАПУСТА (кроме раннеспелых сортов)	Капустная муха	Внесение в почву при высадке рассады	40 г/10 м ²	1	60
 ЛУК (кроме лука на перо)	Луковая муха	Внесение в почву при посадке луковиц	50 г/10 м ²	1	60

Примечание: 1 чайная ложка препарата соответствует 5 г





Пиноцид®

Незаменимый препарат от комплекса вредителей на хвойных растениях

- уничтожает вредителей за 24 часа
- действует на широкий спектр насекомых
- имеет пролонгированное действие
- обладает выраженными системными и контактными свойствами
- высокая активность в широком диапазоне температур

Срок годности 3 года
Объём упаковки 2 мл (пластиковая ампула); 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество 125 г/л альфа-циперметрина + 100 г/л имидаклоприда + 50 г/л клотианидина, СК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ХВОЙНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	Хермесы, тли, щитовки, ложнощитовки, мучнистые червецы, пилильщики, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	0,5-1,5 л/куст <i>(зависит от возраста и типа формирования куста)</i>	1	–
				1-5 л/дерево <i>(зависит от возраста и объёма кроны)</i>	1	





Прofilактин®

Двухкомпонентный препарат для ранневесенней обработки плодовых и ягодных культур

- борется с зимующими стадиями вредителей
- действует уже при температуре от +4 °С
- уничтожает клещей, щитовок, ложнощитовок, медяниц, тлей, листовёрток и других насекомых

Срок годности 2 года
Объём упаковки 500 мл (флакон)
Действующее вещество 13 г/л малатиона + 658 г/л вазелинового масла, МКЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША	Зимующие фазы медяниц, листовёрток, тлей, клещей, щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	от 2 до 5 л/дерево <i>(зависит от возраста и сорта дерева)</i>	1	60
 СЛИВА, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ	Зимующие фазы медяниц, листовёрток, тлей, клещей, щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	от 2 до 5 л/дерево <i>(зависит от возраста и сорта дерева)</i>	1	60
 СМОРОДИНА	Зимующие фазы листовёрток, тлей, клещей, щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	от 1 до 1,5 л/куст	1	60
 КРЫЖОВНИК	Зимующие фазы листовёрток, тлей, клещей, щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	от 1 до 1,5 л/куст	1	60



Профилектин® ЛАЙТ

Эффективный препарат на основе минерального масла для обработки плодовых, ягодных, декоративных культур и винограда ранней весной

- борется с зимующими вредителями на всех стадиях их развития
- действует уже при температуре от +4 °С
- обладает быстрым контактным действием
- подходит для экологического земледелия

Срок годности 2 года
Объём упаковки 1 л (флакон)
Действующее вещество 658 г/л вазелинового масла, ВЭ



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША, АЙВА	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, молей, медяниц, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объёма кроны)	1	–
 ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объёма кроны)	1	–
 ВИНОГРАД	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста)	1	–
 СМОРОДИНА	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста)	1	–
 КРЫЖОВНИК	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста)	1	–
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста)	1	–





Проволокс®

Эффективный препарат для защиты от проволочника

- обладает контактно-кишечным механизмом действия
- характеризуется длительным защитным периодом
- снижает число повреждённых клубней
- не вызывает привыкания у вредителей
- не токсичен для растений в рекомендуемых нормах расхода

Срок годности 3 года
Объём упаковки 40 г, 120 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ <i>(кроме раннеспелых сортов)</i>	Проволочники	Внесение в почву при посадке	40 г/10 м ²	1	–





Слизнед® НЕО

Современный препарат от слизней и улиток на плодовых, овощных, цветочных культурах, картофеле, винограде и землянике

- удобен в применении
- обладает высокой эффективностью и длительным защитным действием
- помогает избежать снижения урожайности и потери товарного вида продукции

Срок годности 2 года
Объём упаковки 14 г, 28 г, 56 г, 98 г (пакет); 294 г (банка)
Действующее вещество 30 г/кг метальдегида, Г

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ПЛОДОВЫЕ, ОВОЩНЫЕ, ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ, КАРТОФЕЛЬ, ВИНОГРАД, ЗЕМЛЯНИКА	Слизни, улитки	Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м ² , расположенных на 10 м ² защищаемой площади. Интервал между обработками: 7-14 дней	7 г/10 м ²	3	–

В качестве приманочных площадок можно использовать свежесрезанные листья накрытые черной полиэтиленовой пленкой или мешковиной с целью создания влажности, благоприятной для жизнедеятельности слизней.





Сэмпай®

Средство для уничтожения гусениц на овощных и плодовых культурах

- вызывает быструю гибель вредителей в течение 0,5-2 ч.
- обладает хорошим отпугивающим эффектом
- уничтожает гусениц на любой стадии развития
- имеется опыт успешного применения против американской бабочки и листовёртки на винограде

Срок годности 4 года
Объём упаковки 5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 50 г/л эсфенвалерата, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодовая гусеница, листовёртка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и сорта дерева)	1	30
 КАПУСТА	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1	30





Табу®

Современный протравитель клубней картофеля от колорадского жука, проволочника и лука-севка от луковой мухи

- обладает выраженной системной активностью, защищая растения на уязвимой стадии проростков и всходов
- имеет длительный период защитного действия
- эффективен вне зависимости от условий окружающей среды

Срок годности 3 года
Объем упаковки 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество 500 г/л имидаклоприда, ВСК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней перед посадкой	8 мл/1 л воды	1 л/100 кг клубней	1	-
		Обработка дна борозды во время посадки	4 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1	90
 ЛУК-СЕВОК (на репку)	Луковая муха	Обработка лука-севка перед посадкой путем погружения в 0,1% раствор с экспозицией 2 часа	1 мл/1 л воды	1 л/1 кг луковиц	1	-





Табу® ТРИО

Комплексная защита картофеля с антистрессовым эффектом от вредителей и болезней

- используется в виде баковой смеси из трёх препаратов
- применяется путём опрыскивания клубней перед посадкой
- защищает от колорадского жука, проволочника, ризиктониоза (парши) и фузариоза (гнилей) на длительный срок
- повышает урожайность, количество и размер клубней

Срок годности	3 года
Объём упаковки	4 мл + 10 мл + 5 мл (пластиковые ампулы)
Действующее вещество	500 г/л имидаклоприда, ВРК + 75 г/л флудиоксонила, СК + 500 мг/л коллоидного серебра, ВР

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Предпосадочная обработка клубней для защиты от колорадского жука, проволочника, ризиктониоза и фузариоза	Ампула №1 + Ампула №2 + Ампула №3 } 500 мл воды	500 мл/50 кг клубней	1	–





Танрек®

Проверенный временем препарат для борьбы с личинками и взрослыми особями колорадского жука

- обладает системным механизмом действия
- устойчив к смыванию дождём, обеспечивает защиту всех частей растения
- характеризуется длительным защитным периодом
- эффективен при любых температурах

Срок годности 4 года
Объём упаковки 1 мл (ампула); 10 мл, 50 мл, 100 мл (флакон)
Действующее вещество 200 г/л имidakлоприда, ВРК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	РАСХОД	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	1 мл/4 л воды	4 л/100 м²	1	20





Танрек®

Эффективное средство от тли и белокрылки на овощных, плодовых, ягодных и цветочных культурах

- обладает высокой системной активностью, позволяет предотвратить развитие новых поколений вредителей
- устойчив к смыванию дождём
- характеризуется длительным защитным периодом
- эффективен независимо от погодных условий

Срок годности 4 года
Объём упаковки 1,5 мл, 7 x 1,5 мл (ампула); 12 мл (флакон)
Действующее вещество 200 г/л имидаклоприда, ВРК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Тли	Опрыскивание в период вегетации	3 мл/10 л воды	от 1 до 5 л/дереву <i>(зависит от возраста и сорта дерева)</i>	1	7
	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 1 до 5 л/дереву <i>(зависит от возраста и сорта дерева)</i>	1	7
 СМОРОДИНА	Тли	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 0,5 до 1 л/куст <i>(зависит от возраста и типа формирования куста)</i>	1	7
 ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ <i>защищённого грунта</i>	Тли, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	10 л/100 м²	1	3
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Тли, цикадки, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	10 л/100 м²	1	–





Шарпей®

Универсальный быстродействующий препарат от комплекса вредителей

- оказывает мгновенное действие на вредителей – «нокдаун-эффект»
- экономичен благодаря низким нормам расхода
- способен нарушать откладку яиц у взрослых насекомых и питание личинок
- имеет прогрессивную препаративную форму (микроэмульсия), устойчивую к воздействию высоких температур

Срок годности	3 года
Объём упаковки	1,5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	250 г/л циперметрина, МЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук, картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/3 л воды	до 3 л/100 м ²	2	20
 КАПУСТА	Белянки, совки, моли	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/3 л воды	до 3 л/100 м ²	3	25
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодовая жук, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	3 мл/10 л воды	от 1 до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта дерева)	2	20
 ВИНОГРАД	Листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/10 л воды	от 0,3 до 0,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	3	25
 МОРКОВЬ*	Муха морковная, листоблошки	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/4 л воды	до 4 л/100 м ²	2	20

*зарегистрировано в республике Беларусь





Террадокс®

Универсальный препарат от муравьёв, медведки, майского хруща, капустной и луковой мух, проволочников и других почвенных вредителей

- применяется для защиты овощных, плодовых, ягодных, цветочных, лесных культур и картофеля
- имеет усовершенствованную гранулированную форму
- создает надёжную длительную защиту вокруг растений
- обладает высокой скоростью воздействия
- не токсичен для культур в рекомендуемых нормах

Срок годности 3 года
Объём упаковки 100 г, 200 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА (кроме раннеспелых сортов), ЛУК (кроме лука на перо)	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см в период вегетации	20 г/10 м ²	2	60
	Муравьи	Внесение в муравейник или места скопления муравьёв на глубину 2-3 см	3 г/1 м ²	1	60
 КАРТОФЕЛЬ (кроме раннеспелых сортов)	Проволочники	Внесение в почву при посадке	40 г/10 м ²	1	60
 КАПУСТА (кроме раннеспелых сортов)	Капустные мухи	Внесение на поверхность почвы при высадке рассады	40 г/10 м ²	1	60
 ЛУК (кроме лука на перо)	Луковая муха	Внесение на поверхность почвы при высадке луковиц	50 г/10 м ²	1	60



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ <i>(кроме горшечных)</i>	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см в период вегетации	20 г/10 м ²	2	-
	Почвенные мушки, грибные комарики, бороздчатый долгоносик	Внесение на поверхность почвы вокруг растений	2-3 г/1 м ²	1	-
 ЗЕМЛЯНИКА <i>(после сбора урожая)</i>	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см после сбора урожая	20 г/10 м ²	2	-
 САЖЕНЦЫ И СЕЯНЦЫ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ, ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР	Личинки майского жука и хрущей, проволочники, ложнопроволочники	Обмакивание корней сеянцев (саженцев) в «болтушку» (инсектицидно-земляную смесь, которая готовится в пропорции: 0,2 л воды + 8 г инсектицида + 0,8 л земли) перед высадкой в грунт	8 г/1 л «болтушки»	2	-
		Повторное внесение препарата через 25-30 дней после высадки в грунт поверхностно с последующей заделкой на глубину 5-10 см	40-50 г/10 м ²	2	-
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ <i>(кроме комнатных горшечных)</i>	Муравьи	Внесение в муравейник или места скопления муравьёв на глубину 2-3 см	3 г/1 м ²	1	60





Препараты от болезней

ФУНГИЦИДЫ

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

Бомбер®

Дымовая шашка для обработки подвалов и погребов от вредителей, гнилей и плесени

- не имеет аналогов, содержит 2 компонента – фунгицид и инсектицид
- активна против болезней (фузариоза, фомоза и др. гнилей), вредителей (картофельной моли, клещей, мокриц, кивсяков, подвальных слизней, муравьев и др.), а также грызунов
- образующийся дым проникает в труднодоступные места

Срок годности 3 года
 Объем упаковки 5 г (шашка)
 Действующее вещество 300 г/кг тиабендазола + 130 г/кг циперметрина, ДШ



ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 <p>ПУСТЫЕ ПОГРЕБА, ПОДВАЛЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ</p>	Возбудители болезней, вредные членистоногие	Фумигация пустых помещений перед закладкой продукции на хранение	5 г (1 шашка)/20 м ³	1
 <p>ПУСТЫЕ ПАРНИКИ И ТЕПЛИЦЫ*</p>	Вредные членистоногие (кивсяки, паутинные клещи, муравьи и др.), возбудители болезней (Aspergillus, Botritis, Cercospora, Fusarium, Foma, Septoria)	Фумигация пустых помещений перед посадкой рассады	5 г (1 шашка)/20 м ³	1

После обработки выдержать помещение закрытым 3 дня, затем проветривать в течение 2 дней.

*находится в стадии регистрации



Узнайте больше



Бордоская Жидкость

Препарат для обработки плодовых и ягодных культур от болезней ранней весной и в период вегетации

- легко применять, достаточно разбавить водой
- защищает от парши, монилиоза, коккомикоза, плодовой гнили и различных пятнистостей
- не вызывает ожогов на растениях

Срок годности 2 года
Объём упаковки 100 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество 172 г/л меди сульфата трёхосновного, ВСК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНА, ГРУША	Парша, монилиоз	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса»	250 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и сорта дерева)	1	60
		Опрыскивание в период вегетации: первое – после цветения; последующие – с интервалом в 7 дней	100 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и сорта дерева)	3	38
 СЛИВА, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКОС	Клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса»	250 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и сорта дерева)	1	60
		Опрыскивание в период вегетации: первое – после цветения; последующие – с интервалом в 7 дней	100 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и сорта дерева)	3	28
 СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ, КРЫЖОВНИК	Септориоз, антракноз, столбчатая ржавчина	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса»	250 мл/10 л воды	1-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	60
		Опрыскивание в период вегетации: первое – после цветения; последующие – с интервалом в 7 дней	100 мл/10 л воды	1-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	3	смородина – 28 дней, крыжовник – 20 дней





Геката®

Двухкомпонентный препарат для обработки плодовых культур и винограда от комплекса болезней

- обладает защитным и лечащим действием
- характеризуется системными свойствами, равномерно распределяется внутри тканей растения, защищает молодой прирост
- уникальное сочетание действующих веществ эффективно борется с различными болезнями на винограде

Срок годности	3 года
Объём упаковки	3 мл (ампула)
Действующее вещество	120 г/л дифеноконазола + 60 г/л тетраконазола, КМЭ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», последующие – с интервалом 7-14 дней	4-7 мл/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объёма кроны)	3	60
 ЯБЛОНЯ	Гнили плодов при хранении (монилиозная, пенициллезная, серая плесневидная, фомозная, оливковая плесень, фузариозная гниль, горькая)	Опрыскивание в период созревания плодов	6 мл/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объёма кроны)	2	40
 ВИНОГРАД	Оидиум, черная гниль, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: 1-ая обработка – весной в фазе бутонизация – цветение, 2-ая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней	5-7 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	4	30





Здоровая земля®

Комплексный препарат для дезинфекции почвы

- идеальная профилактика развития корневых гнилей
- защищает от заболеваний на длительный срок
- подавляет почвенные инфекции в зоне корней

Срок годности 4 года
 Объем упаковки 50 мл (флакон)
 Действующее вещество 198 г/л тирама + 198 г/л карбоксина, ВСК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 РАССАДА ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ	«Чёрная ножка»	Дезинфекция почвы после высева семян методом полива	2 мл/1 л воды	1 л/0,2 м ²	1	-
 ГОРШЕЧНЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ (кроме комнатных)	Ризиктониозная, питиозная и фузариозная корневые гнили, вертициллёзное увядание	Полив почвы в горшках в период вегетации растений	2 мл/1 л воды	1 л/1-20 горшков (зависит от размеров горшков)	1	-
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Ризиктониозная, питиозная и фузариозная корневые гнили, вертициллёзное увядание	Полив почвы в период вегетации растений	2 мл/1 л воды	1 л/1 м ²	1	-





Инсайд®

Современный комбинированный препарат от фитофтороза и пероноспороза на овощных культурах

- быстро останавливает развитие болезней, имеет длительный период защитного действия
- отлично подходит для профилактических обработок
- устойчив к смыванию дождем
- надежно защищает все части картофеля, лука и томатов от развития и проникновения инфекций

Срок годности 2 года
 Объем упаковки 10 мл (флакон)
 Действующее вещество 200 г/л диметоморфа + 200 г/л флуазинама, СК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе смыкания рядков, последующие – с интервалом 7-10 дней	8-10 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	4	20
 ЛУК РЕПЧАТЫЙ (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней	10 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	3	20
 ВИНОГРАД	Милдью, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое до цветения, последующие с интервалом 10-14 дней	9-12 мл/ 10 л воды	0,5-1 л/куст	3	30
 ТОМАТ (открытого грунта)*	Фитофтороз, альтернариоз	Трехкратное опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе смыкания рядков, последующие – с интервалом 10-14 дней	8-10 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	3	20

*находится в стадии регистрации





Ордан®

Незаменимое лекарство от болезней томатов, огурцов и картофеля

- характеризуется уникальным сочетанием двух активных веществ с различным механизмом действия
- обладает профилактическими, защитными и искореняющими свойствами
- не вызывает привыкания у возбудителей инфекций

Срок годности 3 года
 Объем упаковки 12,5 г, 25 г (пакет)
 Действующее вещество 689 г/кг меди хлорокиси + 42 г/кг цимоксанила, СП

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое до смыкания ботвы в рядах или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-14 дней	25 г/5 л воды	5 л/100 м ²	3	20
 ТОМАТЫ открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней	25 г/5 л воды	5 л/100 м ²	3	5
 ТОМАТЫ защищённого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней	25 г/8 л воды	8 л/100 м ²	3	3
 ОГУРЦЫ открытого грунта	Пероноспороз (ложная мучнистая роса)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней	25 г/5 л воды	5 л/100 м ²	3	5
 ОГУРЦЫ защищённого грунта	Пероноспороз (ложная мучнистая роса)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней	25 г/8 л воды	8 л/100 м ²	3	3





Побелка садовая

Известное средство
для обработки стволов деревьев

- образует покрытие, предохраняющее стволы от насекомых-вредителей и спор грибов-патогенов
- защищает от солнечных ожогов
- повышает стойкость плодовых деревьев к заморозкам и резким температурным перепадам
- не препятствует естественному воздухообмену

Срок годности	3 года
Объём упаковки	500 г (пакет)
Действующее вещество	природный мел, пленкообразующий компонент (натрий карбоксиметилцеллюлоза), порошок

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Солнечные ожоги, морозобойные трещины	<p>Содержимое упаковки залить 750 мл горячей воды, перемешивать 1-2 минуты, оставить на 4-5 часов, после этого ещё раз перемешать. Приготовленный раствор нанести кистью на обрабатываемую поверхность. При необходимости полученный раствор можно разбавить водой до нужной консистенции.</p> <p><i>Внимание! Перед обработкой стволы взрослых деревьев рекомендуется очистить металлической щеткой от старой, отслоившейся коры</i></p>	500 г/750 мл воды	1-2 дерева (зависит от возраста и сорта)	1-2 (весной или осенью)





Раёк®

Высокоэффективный препарат для обработки плодовых и овощных культур от болезней

- обладает длительным профилактическим и лечащим действием
- быстро проникает в ткани растений и не смывается дождём уже через 2 часа после опрыскивания
- защищает листья и плоды
- не вызывает образования «сетки» на плодах, обеспечивает высокое качество продукции

Срок годности 3 года
 Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
 Действующее вещество 250 г/л дифеноконазола, КЭ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зелёный конус», «розовый бутон», последующие два опрыскивания – после цветения с интервалом 10-15 дней	1,5-2 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	4	20
 КАРТОФЕЛЬ	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней	4 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	2	28
 ТОМАТЫ открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней	4 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	2	28
 КОСТОЧКОВЫЕ ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ*	Коккомикоз, монилиальный ожог, клястероспориоз	Опрыскивание в период вегетации	1,5-2 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	4	30

*зарегистрировано в республике Беларусь





Ракурс®

Эффективный препарат от комплекса болезней хвойных и декоративных культур

- содержит уникальную комбинацию двух действующих веществ, характеризующихся различной скоростью проникновения и распределения в растении
- обладает быстрым и сильным профилактическим и лечащим действиями
- имеет пролонгированный защитный период (более 20 дней)

Срок годности	3 года
Объём упаковки	4 мл (пластиковая ампула); 48 мл, 480 мл (флакон)
Действующее вещество	240 г/л эпоксиконазола + 160 г/л ципроконазола, СК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ	Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дерево (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	4	–
	Ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дерево (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	4	–
 ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дерево (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	2-3	–
	Ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дерево (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	4	–
 МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/100 м² (зависит от размера растений)	3	–





Ревус® для лука

Препарат от пероноспороза (ложной мучнистой росы) на луке

- обладает повышенной дождеустойчивостью, не смывается осадками уже через час после опрыскивания
- характеризуется длительной защитой вновь образующейся ткани листа, благодаря трансламинарному перемещению и лечебной активности
- способствует получению стабильных урожаев
- улучшает показатели хранения лука

Срок годности	3 года
Объем упаковки	1,2 мл (пластиковая ампула)
Действующее вещество	250 г/л мандипропамида, КС

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЛУК (репка)	Пероноспороз (ложная мучнистая роса)	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней	1,2 мл/1 л воды	1 л/20 м ²	2	15





Ревус® для томатов

Препарат от фитофтороза на томатах

- обладает повышенной дождеустойчивостью, не смывается осадками уже через час после опрыскивания
- характеризуется длительной защитой вновь образующейся ткани листа, благодаря трансламинарному перемещению и лечебной активности
- способствует получению стабильных урожаев томатов
- не токсичен для растений в рекомендуемых нормах

Срок годности 3 года
 Объем упаковки 3 мл (пластиковая ампула)
 Действующее вещество 250 г/л мандипропамида, КС

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТЫ открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней	3 мл/2,5 л воды	2,5 л/50 м²	4	5





Ревус® для КАРТОФЕЛЯ

Препарат от фитофтороза на картофеле

- не смывается осадками уже через час после опрыскивания
- обладает трансламинарными свойствами, обеспечивая защиту вновь образующейся ткани листа
- улучшает показатели хранения урожая картофеля
- не токсичен для растений в рекомендуемых нормах

Срок годности 3 года
 Объем упаковки 2 x 3 мл (пластиковая ампула)
 Действующее вещество 250 г/л мандипропамида, КС

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней	6 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	4	5





Садовый вар

Необходимое средство для заживления ран плодовых и декоративных деревьев

- имеет две формы упаковки для удобства использования
- применяется при прививках и обрезке ветвей, а также для заживления ран, в т. ч. от солнечных ожогов

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	150 г (туба); 150 г (брикет)
Действующее вещество	<i>туба</i> : мягчитель (петролатум), канифоль, парафин.

КУЛЬТУРА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ



ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Отмершие и отставшие от древесины части коры срезать ножом до здоровой древесины, зачистить, продезинфицировать поражённое место раствором медного купороса и при помощи деревянной лопаточки тонким слоем замазать его садовым варом.

При заделке глубоких ран разрешается добавлять в размягчённый вар наполнитель (мел или доломит в соотношении 1:1)





Синклер®

Протравитель клубней картофеля от почвенных инфекций

- применяется для обработки картофеля перед посадкой и закладкой на хранение
- создает защитный экран на поверхности посадочного материала и вокруг него в почве
- не оказывает отрицательного воздействия на полезные микроорганизмы

Срок годности 3 года
 Объем упаковки 2 x 2 мл (пластиковая ампула)
 Действующее вещество 75 г/л флудиоксонила, СК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Ризиктониоз, фузариоз	Обработка клубней перед посадкой	2 мл/ 100 мл воды	100 мл/10 кг	1	–
	Гнили при хранении: фузариозная, фомозная, мокрая бактериальная, альтернариозная	Обработка клубней семенного картофеля перед закладкой на хранение с последующим подсушиванием	2 мл/ 100 мл воды	100 мл/10 кг	1	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (посадочный материал)*	Гельминтоспориоз, фузариоз, ризиктониоз, пенициллез, серая гниль	Обработка посадочного материала перед посадкой путем погружения в 0,1% рабочий раствор с экспозицией 30 минут и последующим просушиванием	1 мл/ 1 л воды	1 л/1 кг	1	–

! Возможно добавление препарата **Табу** в раствор **Синклера** для предпосадочной обработки картофеля от вредителей и болезней
 *находится в стадии регистрации





Тиовит® Джет

Средство для защиты различных культур от болезней и клещей

- сочетает в себе свойства фунгицида, акарицида и микроудобрения
- идеальная препаративная форма: хорошая прилипаемость, отличное контактное действие
- высокая биологическая эффективность и защита в течение 7-10 дней
- не фитотоксичен при соблюдении регламентов применения

Срок годности 3 года
 Объем упаковки 30 г (пакет)
 Действующее вещество 800 г/кг серы, ВДГ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ВИНОГРАД	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации	30-50 г/10 л воды	10 л/100 м ²	4-6	1
	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации	30-40 г/10 л воды	10 л/100 м ²	1	1
 ЯБЛОНЯ, ГРУША	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30-80 г/10 л воды	10 л/100 м ²	1-6	1
 СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20-30 г/5-10 л воды	5-10 л/100 м ²	1-3	1
 КРЫЖОВНИК	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20-30 г/5-10 л воды	5-10 л/100 м ²	1-6	1
 РОЗА открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20-30 г/5-10 л воды	5-10 л/100 м ²	2-4	1





Топаз®

Специализированный высокоэффективный препарат от мучнистой росы и ржавчины

- обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действиями
- останавливает рост мицелия возбудителя мучнистой росы через 2-3 часа после обработки
- быстро поглощается растениями, что снижает риск смывания дождём

Срок годности 4 года
 Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
 Действующее вещество 100 г/л пенконазола, КЭ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 СМОРОДИНА	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	10 л/100 м²	4	14
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/10 л воды	10 л/100 м²	1	–





Чистоцвет®


Эффективное средство для защиты цветочных и декоративных культур от комплекса болезней

- характеризуется длительным профилактическим и выраженным лечебным свойствами
- обладает системным действием и обеспечивает защиту растений до двух недель
- проникает в растения через 2 часа после обработки и не смывается дождём

Срок годности 3 года
 Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
 Действующее вещество 250 г/л дифеноконазола, КЭ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	2 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	2	–
	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	4 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	2	–
	Пятнистости	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	4 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	4	–
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	2 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	2	–
	Пятнистости	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	4 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	4	–





Препараты от сорняков

ГЕРБИЦИДЫ

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО



Агрокиллер

Концентрированный препарат для уничтожения всех видов сорняков

- уничтожает самые трудноистребимые сорняки, а также нежелательную древесно-кустарниковую растительность
- вызывает полную гибель растений и их корневой системы

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	40 мл, 90 мл, 500 мл, 900 мл (флакон)
Действующее вещество	500 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль), ВР

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 УЧАСТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ ГАЗОННЫХ ТРАВ	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам за 14 дней до посева газонных трав	30 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1
	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т. ч. злостные	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам за 14 дней до посева газонных трав	40 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ (ПОСАДКУ) КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (обочины дорог, изгородь и т.д.)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т. ч. злостные	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам	40 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1
	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам	30-50 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1

! Добавление препарата **Адыю** в раствор **Агрокиллера** усиливает действие гербицида



Агрокиллер + Магнум®

Боекомплект для эффективной борьбы с борщевиком и злостными сорняками

- применяется путём последовательного смешивания двух препаратов
- максимальная эффективность достигается при обработке борщевика высотой 15-30 см, до образования семян
- раствор проникает в растение через наземную часть и корневую систему, что приводит к остановке роста и гибели сорняков
- уничтожает также амброзию, бодяк, пырей, вьюнок, одуванчик, марь, осот, плевел, хвощ и др.

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	40 мл (флакон) + 2 г (пакет)
Действующее вещество	600 г/кг метсульфурон-метила, ВДГ + 500 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль), ВР



КУЛЬТУРА	СОРНЯЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 <p>УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ ИЛИ ПОСАДКУ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (обочины дорог, вдоль изгороди и др.)</p>	Однолетние и многолетние злостные сорняки, в т. ч. борщевик Сосновского	Опрыскивание вегетирующих сорняков	40 мл+2 г/3 л воды	3 л/100 м ²	1

! Добавление препарата Адыо в раствор Агрокиллера + Магнума усиливает действие гербицидов





Деймос для газона

Эффективный препарат против широколистных сорняков на газонах

- поддерживает декоративность газонов за счет уничтожения широколистных растений
- эффективно борется с такими сорняками, как одуванчик, клевер, звездчатка средняя (мокрица), марь (виды), осоты, лютик и др.
- действует избирательно, не повреждая газонную траву
- уничтожает сорняки, устойчивые к гербицидам из других химических классов

Срок годности	5 лет
Объем упаковки	10 мл (пластиковая ампула); 40 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество	480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли, ВРК

КУЛЬТУРА	СОРНЯЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ВЗРОСЛЫЕ ГАЗОНЫ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ, В Т. Ч. СИЛЬНО ЗАСОРЕННЫЕ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков. Во избежание ожогов газона рекомендуется его предварительный полив	20 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1
 МОЛОДЫЕ ИЛИ ОСЛАБЛЕННЫЕ ГАЗОНЫ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	10 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1

! Добавление препарата **Адью** в раствор **Деймоса для газона** усиливает действие гербицида





Деймос Гель

Проверенный препарат в форме геля для точечного уничтожения сорняков

- полностью готов к применению, удобно наносить на сорные растения
- уничтожает более 40 видов сорняков, в т. ч. одуванчик, клевер, звездчатку (мокрицу), марь, осоты, лютик и др.
- вызывает гибель сорняков, устойчивых к гербицидам из других химических классов
- имеет высокую скорость проникновения в растения

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	50 мл (туба)
Действующее вещество	50 г/кг дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ГАЗОНЫ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	<p>Препарат готов к применению.</p> <p>На поверхность листа сорного растения выдавить полоску геля длиной 1 см и с помощью специального аппликатора распределить гель по поверхности листа на площадь 100 см².</p>	0,1 г /100 см² <i>листовой поверхности</i>	1





Деймос

Эффективный препарат для очистки
целинных участков, дорожек и др.
от злостных широколистных сорняков

- уничтожает более 40 видов сорняков, в т. ч. амброзию, в т. ч. амброзию, осоты, клевер, марь, звездчатку и др.
- вызывает гибель сорняков, устойчивых к гербицидам из других химических классов
- имеет высокую скорость проникновения
- полностью разлагается в почве за период вегетации

Срок годности	5 лет
Объем упаковки	90 мл, 900 мл (флакон)
Действующее вещество	480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли, ВРК

КУЛЬТУРА	СОРНЯЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 <p>УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ ИЛИ ПОСАДКУ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)</p>	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	30 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1

! Добавление препарата **Адью** в раствор **Деймоса** усиливает действие гербицида
!! Для сплошного уничтожения сорняков (двудольных и злаковых) рекомендуется совместное применение с гербицидом **Миура**



Деймос + Миура®

Двойной удар по сорнякам

- уничтожают более 90 видов сорняков
- обладают высокой скоростью проникновения в сорные растения
- полностью разлагаются в почве
- рекомендуются для очистки целинных участков
- применяются путём смешивания двух препаратов



Срок годности	5 лет (Деймос); 4 года (Миура)
Объём упаковки	45 мл + 12 мл (флаконы)
Действующее вещество	480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли, ВРК + 125 г/л хизалофоп-П-этила, КЭ

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	45 мл +12 мл/4,5 л воды	4,5 л/150 м²	1

! Добавление препарата Адьо в раствор Деймоса + Миуры усиливает действие гербицидов





Миура®

Современный препарат для защиты овощных культур от злаковых сорняков

- эффективно уничтожает практически все виды злаковых сорняков, в т. ч. пырей, овсюг, плевел и др.
- действует избирательно, не оказывает отрицательного влияния на морковь, лук, капусту, картофель
- ускоренно поглощается листьями и надземными частями сорняков, переносится к точкам роста побегов и корневищ, способствуя быстрой гибели сорной растительности

Срок годности	4 года
Объём упаковки	4 мл (ампула); 12 мл (флакон)
Действующее вещество	125 г/л хизалофоп-П-этила, КЭ

КУЛЬТУРА	СОРНЯЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, ЛУК ВСЕХ ГЕНЕРАЦИЙ (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые сорняки (виды щитинника, овсюг и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев	4 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	1	40
	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см	8 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	1	40
 МОРКОВЬ (в том числе для пучкового товара)	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев	4 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	1	20
	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см	8 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	1	20
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих однолетних сорняков в фазе 2-4 листьев и многолетних сорняков при высоте 10-15 см	8 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	-

! Добавление препарата **Адью** в раствор **Миуры** усиливает действие гербицида





Лазурит®

Незаменимое средство в борьбе с сорняками на картофеле

- уничтожает сорняки в момент их прорастания при довсходовом или в течение 10-20 суток при послевсходовом применении
- обеспечивает надёжную защиту от сорной растительности на протяжении 1-2 месяцев
- не оказывает отрицательного влияния на картофель
- выпускается также в инновационной водорастворимой упаковке

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	10 г, 20 г (пакет)
Действующее вещество	700 г/кг метрибузина, СП

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ (кроме раннелетнего)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	10 г/3 л воды	3 л/100 м ²	1	–
		Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см	10 г/3 л воды (первое опрыскивание) 10 г/9 л воды (второе опрыскивание)	3 л/100 м ² 9 л/300 м ²	2	–

! Добавление препарата **Адыо** в раствор **Лазурита** усиливает действие гербицида



Лазурит® Т

Драгоценный помощник в борьбе с сорняками на томатах



- применяется для борьбы со многими видами сорных растений
- обладает продолжительным периодом защитного действия
- эффективно подавляет проростки сорняков в почве
- имеет широкий диапазон применения

Срок годности 5 лет
Объем упаковки 5 г (пакет)
Действующее вещество 700 г/кг метрибузина, СП

КУЛЬТУРА	СОРНЯЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТ <i>рассадный</i>	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт	10-12 г/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
		Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт	10 г/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
 ТОМАТ <i>посевной</i>	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры	20 г/10 л воды	3 л/100 м ²	1	60
		Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры	10 г/10 л воды (первое опрыскивание) 10 г/6 л воды (второе опрыскивание)	2 л/100 м ² 3 л/100 м ²	2	60

! Добавление препарата **Адыю** в раствор **Лазурита Т** усиливает действие гербицида



Лазурит® УЛЬТРА

Умная прополка картофеля и томатов

- создает в почве экран против прорастания сорняков, при этом не повреждает картофель и томаты
- уничтожает амброзию, горцы, звездчатку, марь, мятлик, осот, ромашку, щирицу и множество других сорных растений
- защищает посадки на протяжении 1-2 месяцев
- выпускается в удобной жидкой форме

Срок годности 2 года
Объем упаковки 9 мл (флакон)
Действующее вещество 600 г/л метрибузина, СК



КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТ <i>рассадный</i>	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт	13-16 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
		Опрыскивание почвы через 15-20 дней после высадки рассады в грунт	12 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
 ТОМАТ <i>полевой</i>	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры	8 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
		Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры	3 мл/3 л воды (первое опрыскивание) 5 мл/3 л воды (второе опрыскивание)	3 л/100 м ² 3 л/100 м ²	2	60
 КАРТОФЕЛЬ <i>(кроме раннелетнего)</i>	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	8-16 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
		Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см	6-12 мл/3 л воды (первое опрыскивание) 3,5 мл/3 л воды (второе опрыскивание)	3 л/100 м ²	2	60
		Опрыскивание по сорнякам при высоте культуры до 5 см	8-9 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60





Магнум®

Препарат от двудольных сорняков на участках и территориях не предназначенных под посев, а также на отстойках, вокруг построек и т. д.

- проникает во все части растения, включая корни
- подавляет проростки сорняков в почве
- период защитного действия не менее 6 месяцев
- гибель сорняков наступает через 10-20 дней в зависимости от погодных условий

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	4 г (пакет)
Действующее вещество	600 г/кг метсульфурон-метила, ВДГ

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих однолетних сорняков в фазе 2-4 листьев, многолетних при высоте 10-15 см	2 г/3 л воды	3 л/100 м ²	1	-

*! Добавление препарата **Адыю** в раствор **Магнума** усиливает действие гербицида*





Торнадо® ЭКСТРА

Известный препарат сплошного действия с новой усиленной формулой

- активен против большинства сорных растений, таких как бодяк, пырей, подорожник, амброзия, марь и др.
- ускоренно поглощается листьями и надземными частями сорняков и переносится к корневой системе, способствуя быстрому отмиранию всех частей растений
- идеальное решение для осенней обработки участков против многолетних корневищных сорняков

Срок годности	5 лет
Объем упаковки	40 мл, 90 мл, 500 мл, 900 мл (флакон)
Действующее вещество	500 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль), ВР

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 УЧАСТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ ГАЗОННЫХ ТРАВ	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам за 14 дней до посева газонных трав	30 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1
	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т. ч. злостные	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам за 14 дней до посева газонных трав	40 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ (ПОСАДКУ) КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (обочины дорог, изгородь и т.д.)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т. ч. злостные	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам	40 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1
	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам	30-50 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1

! Добавление препарата **Адыю** в раствор **Торнадо ЭКСТРА** усиливает действие гербицида



Хакер®

Высококонцентрированное средство избирательного действия для борьбы с сорняками на газоне

- обладает системными свойствами
- легко перемещается по растению, нарушая процесс деления клеток и прекращая его рост
- уничтожает различные виды сорняков, в т. ч. одуванчик, ромашку, бодяк, виды осота, паслён и др.
- подавляет рост сорняков, не повреждая злаковые газонные травы

Срок годности	3 года
Объём упаковки	2,5 г (пакет)
Действующее вещество	750 г/кг клопиралида, ВРГ



КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ГАЗОНЫ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (одуванчик, подорожник, щавель, лютик и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков через 1-2 дня после первого укоса	2,5 г/5 л воды	5 л/100 м ²	1

! Добавление препарата **Адью** в раствор **Хакера** усиливает действие гербицида



Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

Адьювант

УСИЛИТЕЛЬ
АКТИВНОСТИ
ПРЕПАРАТОВ



Адью®

Усилитель активности средств защиты растений и удобрений

- увеличивает проникающую способность препаратов
- предотвращает скатывание капель растворов с растений, листья которых густо опушены или сильно покрыты восковым налётом
- повышает дождестойкость препаратов
- уменьшает степень испарения с листьев при обработке

Срок годности	4 года
Объём упаковки	2 мл (ампула)
Действующее вещество	900 г/л этоксилата изодецилового спирта

НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 <p>СПОСОБСТВУЕТ ЛУЧШЕМУ ПРИЛИПАНИЮ И ПРОНИКНОВЕНИЮ В РАСТЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ</p>	<p>Препарат добавляется в рабочие растворы инсектицидов, гербицидов, фунгицидов, а также удобрений при каждом их использовании</p>	<p>2 мл/3 л рабочего раствора</p>	<p>согласно регламенту применения совместно используемого препарата</p>	<p>согласно регламенту применения совместно используемого препарата</p>





Комплексные удобрения

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО



МикроМикс®

avgust crop protection

Корнепитатель – Цветы

Комплексное удобрение длительного действия с микроэлементами

- обеспечивает непрерывное локальное поступление питательных веществ в растения
- исключает передозировку
- улучшает декоративные качества цветочных культур
- применяется также для подкормки комнатных цветов

Срок годности 5 лет
Объем упаковки 5 x 10 г (водорастворимые пакетики)
Действующее вещество N – 12%; P – 8%; K – 18%; Mg – 2,5% + микроэлементы

КУЛЬТУРА

СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

При высадке рассады в грунт 1 пакетик удобрения положить на дно лунки, присыпать почвой слоем 5-7 см, затем посадить растение и полить. Далее проводится обычный уход и полив

Размещение удобрения к уже высаженной рассаде следует проводить сбоку на глубину не менее 7-10 см и не ближе 15-20 см от стеблей (осторожно, чтобы не повредить корни), присыпать землей. Далее проводится обычный уход и полив



МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

(пионы, астильбы, хосты, лилейники и пр.)

Рано весной положить пакетик в почву на глубину не менее 7-10 см и не ближе 20-30 см от стеблей (осторожно, чтобы не повредить корни), присыпать землей.

В зависимости от возраста и вегетативной массы размещают 2-3 до 5 (максимум 10 для старых мощных кустов) пакетиков удобрения, равномерно вокруг кустов. Далее проводится обычный уход и полив



ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

(розы, сирень, лапчатки, спиреи и др.)

В зависимости от возраста и вегетативной массы равномерно размещают от 2 до 6 (максимум 10 для старых мощных кустов и деревьев) пакетиков удобрения вокруг растений, не ближе 20-40 см от стволов. Далее проводится обычный уход и полив



КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

При посадке или пересадке цветов на дренаж, присыпанный почвой слоем 4-6 см, помещают пакетик, засыпают почвой 4-6 см и сажают растения. Удобрение применяют из расчета 1 пакетик на контейнер 12-15 л. Далее проводится обычный уход и полив

При раскладке пакетики не вскрывать!





МикроМикс®

Водорастворимое комплексное бесхлорное удобрение с микроэлементами

- содержит сбалансированный состав элементов питания
- обеспечивает получение высоких урожаев, ускоряет рост и развитие растений
- применяется для подкормки овощных, плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур в комнате, на балконе и даче
- не содержит хлора и тяжёлых металлов

Срок годности 3 года
Объём упаковки 100 г (пакет)
Действующее вещество N – 11%, P – 11%, K – 21%, Mg – 2,5% + микроэлементы

КУЛЬТУРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Подкормка растений через 7-10 дней после посадки (или появления всходов), последующие с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м ² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м ² (некорневая подкормка)	3-4
 ЛУК И ЧЕСНОК	Корневая подкормка через 7-10 дней после появления всходов, последующие с интервалом 10-15 дней. Полив прекращают за 15-20 дней до уборки	20 г/10 л воды	5-10 л/м ²	3-4
 КАРТОФЕЛЬ	Подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов, последующие с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м ² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м ² (некорневая подкормка)	3-4



КУЛЬТУРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 РЕДИС И ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ (укроп, лук на перо, салат и др., кроме посевов на семена)	Подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов, последующие – с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ЯБЛОНИ, ГРУШИ И ДР.	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, последующие – с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК, МАЛИНА, ВИШНЯ И ДР.	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, последующие – с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ЗЕМЛЯНИКА	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, последующие с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ в открытом грунте	Подкормка многолетних растений весной в начале возобновления вегетации, последующие с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
	Подкормка растений через 7-10 дней после посадки (или появления всходов), последующие с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Подкормка растений	2 г/1 л воды	до увлажнения земляного кома (корневая подкормка); до увлажнения поверхности листьев (некорневая подкормка)	1 раз/7-10 дней (март – октябрь), 1 раз/месяц (ноябрь – февраль)

Примечание: 15-20 г удобрения соответствуют 1 столовой ложке
 Подробные рекомендации по применению см. на упаковке



Регуляторы роста растений

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО



Корень Супер®

Стимулятор корнеобразования саженцев и черенков плодовых, ягодных, декоративных культур

- способствует ускоренному формированию мощной корневой системы
- повышает приживаемость
- снимает стресс при высадке растений

Срок годности 3 года
 Объем упаковки 5 г, 10 г (пакет)
 Действующее вещество 5 г/кг 4(индол-3ил) масляной кислоты, ВРГ

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (черенки)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Обмакивание предварительно увлажненного нижнего среза черенка	10-20 мг/ черенок		1	–
 ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (саженцы)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Замачивание корневой системы на 6 часов	1 г/1 л воды	1 л/растение	1	–
		Полив под корень через 10 дней после высадки	1 г/1 л воды	0,5 л/растение	1	–





Почкорост®

Цитокининовая паста для увеличения количества цветоносов и обильного цветения орхидей и других цветочных культур

- пробуждает спящие почки
- способствует формированию новых побегов и нескольких цветоносов
- стимулирует образование «деток» на луковичных и клубнелуковичных растениях

Срок годности	2 года
Объем упаковки	1,5 г (пластиковая туба)
Действующее вещество	10 г/кг 6-бензиламинопурина, ПС

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОРХИДЕЯ (все виды)	Пробуждение спящих почек, формирование новых побегов и цветоносов	Нанесение препарата на спящую почку тонким слоем специальным аппликатором	1,5-2 мг/почку	1	–
 ФИАЛКА (сенполия)	Стимуляция цветения	Нанесение препарата на место прикрепления прицветников к цветоносу тонким слоем специальным аппликатором	1,5-2 мг/почку	1	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (луковичные, клубнелуковичные)	Пробуждение спящих почек, стимуляция образования «деток»	Нанесение препарата на донце луковицы, клубнелуковицы тонким слоем специальным аппликатором	2 мг/1 шт.	1	–
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (кустарники)	Пробуждение спящих почек, стимуляция образования новых побегов	Нанесение препарата на спящую почку тонким слоем специальным аппликатором с интервалом 10 дней	2 мг/почку	2	–

Для лучшего проникновения препарата острым предметом (нож, лезвие, игла и др.) с места обработки осторожно снять эпидермис и нанести пасту тонким слоем специальным аппликатором (удлиненным носиком полимерной тубы)





Рэгги®

Регулятор роста растений от перерастания рассады и образования усов у земляники

- предотвращает «вытягивание» рассады
- активизирует развитие корневой системы
- увеличивает толщину стебля, способствует формированию мощного приземистого куста
- уменьшает отрастание побегов (усов) у земляники
- улучшает декоративность цветов

Срок годности 4 года
Объём упаковки 1 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 750 г/л хлормекватхлорида, ВРК

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТ, ПЕРЕЦ (рассада)	Активизация формирования корневой системы, предотвращение перерастания рассады, улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2-е и 3-е – с интервалом 5-8 дней	1 мл/ 1 л воды	300 мл/10 м²	3	–
		Полив растений под корень в фазе 3-4 листьев	1 мл / 1 л воды	30 мл/растение (3 л/1 м²)	1	–
 КАПУСТА (рассада)	Активизация формирования корневой системы, предотвращение перерастания рассады, улучшение качества рассады, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – в фазе семядольных листьев, 2-й и 3-й – с интервалом 7 дней	3 мл/ 1 л воды	1 л/1 м²	3	–
 ЗЕМЛЯНИКА	Повышение устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды, уменьшение отрастания побегов (усов), увеличение количества ягод, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в начале фазы бутонизации, 2-е – через 7 дней после первого опрыскивания	10 мл/ 1 л воды	300 мл/10 м²	2	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (горшечные растения)	Активизация формирования корневой системы, снижение высоты растений, формирование компактного куста, повышение декоративных качеств, продление периода цветения	Полив растений: 1-й – в фазе сформированных, но ещё не окрашенных бутонов, 2-й – через 5-6 месяцев после первого полива	1 мл/ 100 мл воды	50-100 мл/растение	2	–





НОВИНКА
2021

Трафик®

Регулятор роста против прорастания лука и картофеля во время хранения



- подавляет образование проростков на срок до 9 месяцев
- проявляет активное действие уже через 24 часа после обработки
- применяется путём опрыскивания растений в период вегетации за 14-25 дней до сбора урожая

Срок годности	2 года
Объём упаковки	3 мл (ампула)
Действующее вещество	270 г/л малинового гидразида (калиевая соль), ВРК

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЛУК РЕПЧАТЫЙ (на репку)	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении луковиц	Опрыскивание растений за 14-21 день до сбора урожая (при полегании – не более 50%)	3 мл/ 75-100 мл воды	75-100 мл/ 3 м²	1
 КАРТОФЕЛЬ	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении клубней	Опрыскивание растений за 21-25 дней до сбора урожая (при размере сформировавшихся клубней не менее 25 мм)	3 мл/ 60-75 мл воды	60-75 мл/ 2-3 м²	1

Использовать луковицы и картофель в пищу можно через 60 дней после обработки.





Серия «БАУ»

Препараты полностью
готовые к применению

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО



Биотлин® БАУ

Готовый к применению препарат
от тли на овощных и ягодных культурах

- уничтожает тлю и тепличную белокрылку уже через несколько часов после опрыскивания
- имеет длительный защитный период, благодаря системному действию

Срок годности	2 года
Объём упаковки	700 мл (флакон с курковым распылителем, с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество	0,1 г/л имидаклоприда, ВР

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОГУРЕЦ И ТОМАТ <i>защищённого грунта</i>	Тли, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/7 м²	1	3
 СМОРОДИНА <i>(все виды)</i>	Тли	Опрыскивание до цветения	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/1,5-7 кустов (зависит от размеров куста)	1	–
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/35 м²	1	20





Цветолюкс® БАУ

Готовый к применению препарат от тли, трипсов, белокрылки на цветочных и декоративных культурах

- защищает от сосущих вредителей уже через несколько часов после опрыскивания
- благодаря системному действию, предотвращает появление новых поколений вредителей

Срок годности	2 года
Объём упаковки	700 мл (флакон с курковым распылителем, с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество	0,1 г/л имидаклоприда, ВР

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ <i>открытого и защищённого грунта</i>	Тли, трипсы, цикадки, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/7 м ²	1-2
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Тли, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/1,5-7 кустов	1-2
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Тли, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/0,5-1 дерево	1-2





Чистоцвет® БАУ

Готовый к применению препарат от комплекса болезней цветочных и декоративных культур

- защищает в течение 4-5 недель после обработки
- не токсичен для растений
- не смывается дождём уже через 2 часа после опрыскивания

Срок годности	3 года
Объём упаковки	700 мл (флакон с курковым распылителем, с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество	0,7 г/л пропиконазола, ВР

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ <i>открытого грунта</i>	Мучнистая роса, ржавчина, пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/7-28 растений <i>(зависит от размеров растения)</i>	1
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Мучнистая роса, пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/1-7 кустов <i>(зависит от размеров куста)</i>	1
 РОЗЫ	Чёрная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/7-14 растений <i>(зависит от размеров растения)</i>	2





**Серия
«Двойная защита»**

**НАБОРЫ ИЗ ДВУХ
ПРЕПАРАТОВ**

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

АО Фирма «Август» предлагает серию препаратов «Двойная защита», которая создана специально для комплексной обработки плодовых, ягодных, цветочных и декоративных культур. В каждой упаковке содержатся **два наиболее эффективных препарата**, один из которых предназначен для борьбы с вредителями, второй – для лечения и профилактики болезней.

Чистоцвет + Биотлин

Защита цветов от мучнистой росы, пятнистостей и от трипсов, цикадок, тли



Раёк + Алиот

Защита сада от парши, мучнистой росы и от комплекса вредителей



Раёк + Биотлин

Защита сада от парши, мучнистой росы и от тли, цветоеда



Топаз + Биотлин

Защита смородины от мучнистой росы и от всех видов тли




Препарат для защиты от болезней растений

Препарат для защиты от насекомых-вредителей

«Двойная защита»

профессионально защитит ваши растения!

• Выгодная покупка • Комплексное решение •



Препараты от грызунов РОДЕНТИЦИДЫ

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

Super-CAT®

avgust 
crop protection

Super-CAT®

Серия готовых приманок от грызунов


- обладают высокой родентицидной активностью
- смертельная доза может быть получена грызунами в результате однократного поедания приманки
- вызывают 100% гибель крыс и 90% гибель мышей в течение 4-8 суток
- уничтожают даже чувствительных и устойчивых к другим антикоагулянтам грызунов



Срок годности	3 года
Объём упаковки	100 г (пакет, зерно); 100 г (пакет, мягкие брикеты); 48 г (пакет, твёрдые брикеты)
Действующее вещество	0,005% бромадиолонa

ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 КРЫСЫ, Домовые Мыши, Полёвки	<p>Приманку (твёрдые брикеты/мягкие брикеты/зерно) помещают в небольшие ёмкости, специальные контейнеры, на подложки из плотной бумаги, полиэтилена, пластика и раскладывают в местах обитания крыс и домовых мышей.</p> <p>В помещениях ёмкости с приманкой размещают на путях перемещения грызунов и прежде всего в углах, вдоль стен и перегородок, под мебелью, вблизи нор.</p>	<p>20 г/лоток (мыши), 50 г/лоток (крысы)</p> <p><i>Расстояние между местами раскладки от 1 до 5 м (зависит от площади помещений, а также вида и численности грызунов)</i></p>	<p>Приманку восполняют по мере поедания.</p> <p>При высокой численности грызунов приманку раскладывают часто и небольшими порциями</p>





Серия «Мир без вредителей»

Бытовая химия

Оглавление

Алфавитный указатель

Рекомендации садоводам

БИО земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы роста

БАУ

Двойная защита

Родентициды

Бытовая химия

Бытовая химия ЭКО

**МИР БЕЗ
ВРЕДИТЕЛЕЙ**

Специальная серия препаратов бытовой химии разработана для надёжной защиты дома и приусадебного участка от широкого спектра насекомых и вредителей



Оглавление

Алфавитный указатель

Рекомендации садоводам

БИО земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы роста

БАУ

Двойная защита

Родентициды

Бытовая химия

Бытовая химия ЭКО

В неё входят средства:

- от иксодовых клещей
- от клопов
- от комаров и гнуса
- от тараканов, чешуйниц, мокриц
- от домовых и садовых муравьёв
- от слизней и улиток
- от всех видов мух
- от крыс и мышей
- от кротов
- от ос





Клещевит® Супер

Для очистки территорий от иксодовых клещей

- применяется на приусадебных, дачных и садовых участках, в том числе на участках, располагающихся рядом с лесом
- начинает действовать уже через 30 минут после обработки
- защищает на срок 1-1,5 месяца
- малотоксичен для птиц и дождевых червей, не представляет опасности для почвенных микроорганизмов

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 100 мл (флакон)
 Действующее вещество: 25% циперметрина

Клещевит® Супер СПРЕЙ

Для обработки одежды от иксодовых клещей, блох

- отлично подходит для защиты от насекомых во время отдыха на природе, прогулок по лесу
- не просто отпугивает, а уничтожает насекомых
- защитное действие – до 15 суток

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 100 мл (флакон)
 Действующее вещество: 0,25% альфациперметрина



Комароед®

**От комаров, их личинок
и других видов гнуса**

- применяется путём опрыскивания мест посадки и днёвки насекомых: стены подвалов, сараев, низкие кусты, прибрежная растительность, непроточные непитьевые водоёмы, искусственные прудики
- эффективно снижает популяцию различных видов гнуса

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 100 мл (флакон)
 Действующее вещество: 25% циперметрина

НОВИНКА
2021



Комароед® Супер АЭРОЗОЛЬ

**От кровососущих насекомых
(комаров, мошек, слепней, клещей и др.)**

- применяется против насекомых во время отдыха на природе, прогулок в лесу
- можно наносить на одежду и на кожу
- защитит не менее 4-х часов

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 125 мл (флакон)
 Действующее вещество: 36% N,N диэтилтолуамида

НОВИНКА
2022



Кротомет® ДЫМОВАЯ ШАШКА

От кротов

- выделяемый шашкой сернистый диоксид проникает в норы кротов, их ответвления и галереи, полностью изгоняя вредителей с обрабатываемого участка
- удобный фитиль-спичка, обеспечивает задержку начала горения и выделения дыма
- имеет длительное последствие: 2-3 месяца

Срок годности: 3 года
Действующее вещество: 32% серы

НОВИНКА
2022



Крысоед® МЯГКИЕ БРИКЕТЫ

Для уничтожения крыс, мышей, полёвок и других грызунов

- обладает высокой родентицидной активностью
- применяется для уничтожения грызунов в жилых домах, погребах, подвалах и др.
- вызывает гибель грызунов при однократном поедании

Срок годности: 3 года
Действующее вещество: 0,005% бромдиалона



Кукарача®

От тараканов, чешуйниц и мокриц

- применяется на кухнях, в комнатах, ваннах, подвалах и подсобных помещениях
- содержит пищевые привлекатели
- действует по принципу «эпидемии» – насекомые, после соприкосновения с гранулами, переносят препарат на других особей, вызывая гибель всей колонии
- насекомые погибают через 2–3 суток
- гранулированная форма для размещения на подложках

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 50 г (пакет); 100 г (банка)
 Действующее вещество: 0,5% хлорпирифоса



Кукарача® ПРИМАНКА

От всех видов тараканов

- применяется в квартирах и других помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие насекомых
- действует по принципу «эпидемии» – насекомые, после контакта с приманкой, переносят препарат на других особей, вызывая гибель всей колонии
- насекомые погибают через 2–3 суток
- защищает на длительный срок
- удобная для применения форма в виде пластиковых ловушек

Срок годности: 5 лет
 Объём упаковки: 1,5 г x 4 шт (контейнер)
 Действующее вещество: 0,5% хлорпирифоса

Кукарача® ГЕЛЬ

От тараканов, чешуйниц и мокриц

- не имеет запаха
- содержит пищевые привлекатели для насекомых
- удобный носик тубы позволяет наносить гель в труднодоступные места
- обладает продолжительным действием, благодаря длительному высыханию геля
- содержит краситель в составе для маркировки обработанных мест
- остатки препарата легко удаляются при помощи влажной ткани

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 30 мл (туба)
 Действующее вещество: 0,5% имидаклоприда



Кукарача® СПРЕЙ

От тараканов, чешуйниц и мокриц

- применяется на кухнях, в комнатах, ваннах, подвалах и подсобных помещениях
- действует мгновенно: гибель насекомых наступает в течение часа
- отсутствует привыкание у насекомых

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 100 мл (флакон)
 Действующее вещество: 0,1% альфациперметрина, 0,1% тетраметрина



Клопоед®

Для уничтожения постельных клопов и других насекомых

- используется для обработки мест обитания клопов: щели в стенах, полу и мебели, за плинтусами, подоконники, обратные стороны картин, ковров, места отхождения обоев и т. д.
- не имеет сильного запаха
- гибель насекомых наступает на 2 день после обработки
- гарантирует длительный (около месяца) защитный эффект
- отсутствует привыкание у насекомых

Срок годности: 4 года
 Объём упаковки: 100 мл (флакон)
 Действующее вещество: 18,2% имидаклоприда



Муравьед® Супер

От садовых и домашних муравьёв

- применяется на садовых участках, отмостках домов, садовых дорожках и в помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие муравьёв
- проникает сквозь внешнюю оболочку муравьёв и разрушает импульсы, идущие от нервных узлов к мышцам, вызывая у насекомых паралич
- действует по принципу «эпидемии» – муравьи приносят приманку в муравейник, что вызывает гибель всей колонии
- защищает на длительный срок

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 50 г (пакет); 120 г, 240 г (банка)
 Действующее вещество: 0,5% хлорпирифоса



Муравьед® Супер

ПРИМАНКА

От рыжих домашних и садовых муравьёв

- применяется в местах скопления насекомых
- содержит пищевые добавки, привлекающие муравьёв
- действует по принципу «эпидемии» – муравьи приносят приманку в муравейник, что вызывает гибель всей колонии
- насекомые гибнут на 1–3 сутки
- защищает на длительный срок
- удобная для применения форма в виде пластиковых ловушек

Срок годности: 5 лет
 Объём упаковки: 1,5 г x 4 шт (контейнер)
 Действующее вещество: 0,5% хлорпирифоса

Муравьед® Супер ГЕЛЬ

От садовых и домашних муравьёв

- не имеет запаха
- содержит пищевые привлекатели для муравьёв
- удобный носик тубы позволяет наносить гель в труднодоступные места
- обладает продолжительным действием, благодаря длительному высыханию геля
- содержит краситель в составе для маркировки обработанных мест
- остатки препарата легко удаляются при помощи влажной ткани

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 30 мл (туба)
 Действующее вещество: 0,5% имидаклоприда



Мухоед® Супер

От всех видов мух

- применяется для уничтожения мух в помещениях, таких как летние кухни, террасы, беседки и др., а также на фермах
- насекомые погибают в течение нескольких минут после контакта со средством
- содержит пищевые добавки, привлекающие насекомых
- можно использовать в виде пасты для обработки оконных рам и плафонов

Срок годности: 3 года
 Объем упаковки: 10 г (пакет); 80 г (банка)
 Действующее вещество: 0,4% азаметифоса



Мухоед® Супер

ЛИПКАЯ ЛЕНТА

От всех видов мух

- безопасное средство для любых помещений
- работает до двух месяцев
- обладает длительным фиксирующим свойством

Срок годности: 5 лет
 Объем упаковки: 1 лента в гильзе, 100 шт. в коробке
 Действующее вещество: клеевая композиция



Осоед® ГЕЛЬ

От ос и различных видов мух

- не имеет запаха
- содержит пищевые привлекатели для насекомых
- удобный носик тубы позволяет наносить гель в труднодоступные места
- обладает продолжительным действием, благодаря длительному высыханию геля
- содержит краситель в составе для маркировки обработанных мест
- остатки препарата легко удаляются при помощи влажной ткани

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 30 мл (туба)
 Действующее вещество: 0,5% имидаклоприда



Insecta® АЭРОЗОЛЬ

Для уничтожения летающих и ползающих насекомых

- удобная форма в виде аэрозоля
- обладает мгновенным действием
- не оставляет пятен на коврах и мебели
- действует на широкий спектр вредителей, таких как тараканы, муравьи, блохи, клопы, мухи, бабочки моли, сверчки, мокрицы, уховёртки, чешуйницы

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 220 мл, 750 мл (флакон)
 Действующее вещество: 0,25% циперметрина, 0,12% тетраметрина



НОВИНКА
2021



Слизнед® Нео

От слизней и улиток

- применяется путем посева гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
- обладает высокой эффективностью и длительным защитным действием
- помогает избежать снижения урожайности и потери товарного вида продукции


Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

2 года
294 г (банка)
30 г/кг метальдегида

**МИР БЕЗ
ВРЕДИТЕЛЕЙ**



Insecta® АЭРОЗОЛЬ	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Клещевит® Супер КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ			✓													
Клещевит® Супер СПРЕЙ	✓		✓													
Клопоед® ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ	✓			✓	✓	✓	✓							✓		
Комароед® КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ					✓											
Комароед® Супер АЭРОЗОЛЬ			✓		✓											
Кротомет® ДЫМОВАЯ ШАШКА															И	✓
Крысоед® МЯГКИЕ БРИКЕИ											И				К	✓
Кукарача® ГРАНУЛЫ		✓			С			✓		Л				✓	Т	
Кукарача® ПРИМАНКА					У					О				✓	И	И
Кукарача® ГЕЛЬ		✓			Н			✓		М				✓	Л	Ш
Кукарача® СПРЕЙ	✓	✓		✓	Г	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	У	Ы
Муравьед® Супер ГРАНУЛЫ			И			И	✓		Ы	И	И	Т		✓	Н	И
Муравьед® Супер ПРИМАНКА			Н			Ы	✓			Ц	К	К	Р		А	И
Муравьед® Супер ГЕЛЬ		И	И		Ы	Р	✓			И	Ч	Ч	Ё		А	Н
Мухоед® Супер ГРАНУЛЫ		Х	У	Щ	П	А	А	✓		Р	О	Р	В		А	З
Мухоед® Супер ЛИПКАЯ ЛЕНТА		О	Ш	Е	О	М	Р	✓		К	Б	Е	О	Ы	Р	И
Осоед® ГЕЛЬ		Л	Е	Л	О	У	✓			О	А	В	Х	✓	А	Л
Слизнед® Нео ГРАНУЛЫ		Б	Ч	К	К	К	М	М	М	Б	С	У	О	Т	✓	К



**Серия «Мир
без вредителей»
марки ЭКО**

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

**БИО
земледелие**

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

МИР БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЭКО

Специальная серия препаратов бытовой химии и репеллентов марки ЭКО разработана для надёжной защиты дома и приусадебного участка от насекомых и вредителей



Оглавление

Алфавитный указатель

Рекомендации садоводам

БИО земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрения

Регуляторы роста

БАУ

Двойная защита

Родентициды

Бытовая химия

Бытовая химия ЭКО

В неё входят средства:

- от домашних и садовых муравьёв
- от тараканов
- от комаров
- от медведки
- от кротов
- от змей



Змеед® ЭКО ШАРИКИ

Эффективное средство для отпугивания змей

- безопасно для людей, домашних животных и окружающей среды
- обладает репеллентным эффектом
- 100% натуральный состав
- полностью биологически разлагаемо
- содержит уникальную комбинацию отпугивающих запахов

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 50 шариков
 Действующее вещество: комбинация эфирных масел 5%



Медвед® ЭКО ШАРИКИ

Уникальное средство для отпугивания медведки

- безопасно для людей, домашних животных и окружающей среды
- обладает репеллентным эффектом
- 100% натуральный состав
- полностью биологически разлагаемо
- содержит масло дерева ним, которое надёжно защищает участки от медведки

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 50 шариков
 Действующее вещество: комбинация эфирных масел 5%



Кротомет® ЭКО ШАРИКИ



Эффективное средство для отпугивания кротов

- безопасно для людей, домашних животных и окружающей среды
- обладает репеллентным эффектом
- 100% натуральный состав
- полностью биологически разлагаемо
- содержит эфирное масло лаванды, которое надёжно защищает участки от кротов

Срок годности:

3 года

Объём упаковки:

50 шариков

Действующее вещество:

эфирное масло лаванды 2%



Кротомет®



Биоразлагаемые гранулы для отпугивания кротов

- удобная для применения упаковка
- не токсичен для человека и теплокровных животных
- не опасен для пчёл
- не загрязняет окружающую среду

Срок годности:

1 год

Объём упаковки:

75 г (пакет), 400 г (банка)

Действующее вещество:

150 г/кг Allium sativum, Г



НОВИНКА
2022



Комаросед® БИО

От личинок комаров

- применяется путем обработки мест выплода комаров: прудов, канав, непересыхающих луж, бочек и других емкостей с водой, а также затопленных подвалов
- не вызывает загрязнения окружающей среды, не накапливается в растениях
- безопасен для человека и теплокровных

Срок годности:

2 года

Объём упаковки:

15 г (пакет)

Действующее вещество:

комплекс содержащий бактерии
Bacillus thuringiensis var. israelensis



Кукарачка® ЭКО ГЕЛЬ

Для уничтожения тараканов

- применяется в местах скопления насекомых: кухнях, комнатах, квартирах и других помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие тараканов
- попав в организм насекомого, обезвоживает его, вызывает паралич и приводит к гибели
- удобный носик тубы позволяет наносить гель в труднодоступные места
- не имеет запаха
- безопасен для человека и млекопитающих

Срок годности:

2 года

Объём упаковки:

30 мл (туба)

Действующее вещество:

5% борной кислоты



Кукарача® ЭКО

Для уничтожения тараканов

- применяется в местах скопления насекомых: квартирах, кухнях, комнатах и других помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие тараканов
- воздействует на нервную систему насекомого, вызывает паралич, приводя его к гибели
- уничтожает тараканов за 5-7 суток
- не имеет запаха
- безопасен для человека и млекопитающих

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

2 года
50 г (пакет); 120 г (банка)
5% борной кислоты



Кукарача® ЭКО ПРИМАНКА

Для уничтожения тараканов

- применяется в местах скопления насекомых: кухнях, комнатах, квартирах и других помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие тараканов
- воздействует на нервную систему насекомого, вызывает паралич, приводя его к гибели
- удобная для применения форма в виде пластиковых ловушек
- не имеет запаха
- безопасен для человека и млекопитающих

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

2 года
1,5 г x 4 шт (контейнер)
5% борной кислоты

Муравьед® ЭКО ГЕЛЬ

От садовых и домовых муравьёв

- применяется в коттеджах, на отмостках домов, садовых дорожках, террасах, верандах, в ваннных, душевых и других помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие муравьёв
- попав в организм насекомого, обезвоживает его, вызывает паралич и приводит к гибели
- удобный носик тубы позволяет наносить гель в труднодоступные места
- не имеет запаха
- безопасен для человека и млекопитающих

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 30 мл (туба)
 Действующее вещество: 5% борной кислоты



Муравьед® ЭКО

От садовых и домовых муравьёв

- применяется в коттеджах, на отмостках домов, террасах, верандах, в ваннных, душевых и других помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие муравьёв
- воздействует на нервную систему насекомого, вызывает паралич, приводя его к гибели
- уничтожает муравьёв за 2-3 суток
- не имеет запаха
- безопасен для человека и млекопитающих

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 50 г (пакет); 120 г (банка)
 Действующее вещество: 5% борной кислоты





Муравьед® ЭКО

ПРИМАНКА

От садовых и домовых муравьёв

- применяется в коттеджах, на отмостках домов, террасах, верандах, в кухнях, ванных, душевых и других помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие муравьёв
- удобная для применения форма в виде пластиковых ловушек
- не имеет запаха
- безопасен для человека и млекопитающих

Срок годности:

2 года

Объём упаковки:

1,5 г x 4 шт (контейнер)

Действующее вещество:

5% борной кислоты

**МИР БЕЗ
ВРЕДИТЕЛЕЙ**

						
Змеед® ЭКО ШАРИКИ						✓
Медвед® ЭКО ШАРИКИ				✓		
Кротомет® ЭКО ШАРИКИ					✓	
Кротомет® ГРАНУЛЫ					✓	
Комароед БИО® ПОРОШОК	✓					
Кукарача® ЭКО ГРАНУЛЫ			✓			
Кукарача® ЭКО ПРИМАНКА			✓			
Кукарача® ЭКО ГЕЛЬ			✓			
Муравьед® ЭКО ГРАНУЛЫ		✓				
Муравьед® ЭКО ПРИМАНКА		✓				
Муравьед® ЭКО ГЕЛЬ		✓				

С нами расти легче

Мы неустанно идем в ногу со временем и стараемся жить на одной волне с нашими потребителями. Именно поэтому мы, совершенствуясь, создаем условия для получения полной информации о препарате, его пользе, нормах применения или исследованиях.

Для поддержки потребителей мы создали **телефонную горячую линию**

**Многоканальный
телефон справочной службы**
(бесплатно по России)
8-800-700-03-57

Для просмотра видеоинструкций или роликов подписывайтесь на [youtube.com/avgustdacha](https://www.youtube.com/avgustdacha)



 YouTube

Для быстрого получения полной информации о препарате мы стали размещать на упаковке **QR-code**. Найдите его, наведите камеру телефона с доступом в интернет или отсканируйте его с помощью специального приложения и перейдите на страницу препарата на нашем сайте



Заходите на наш сайт:

dacha.avgust.com

Также, мы представлены здесь:

Instagram avgust_dacha

Вконтакте vk.com/avgustdacha

TikTok tiktok.com/@avgust_dacha

Одноклассники ok.ru/avgustdacha

Яндекс Дзен zen.yandex.ru/avgust_dacha





Кротомет[®] ДЫМОВАЯ ШАШКА

Надежное средство для отпугивания кротов

- Выделяет сернистый диоксид, который проникает в норы кротов, их ответвления и галереи, полностью изгоняя вредителей с обрабатываемого участка
- Удобный фитиль-спичка обеспечивает задержку начала горения и выделения дыма
- Имеет длительное последствие – 2-3 месяца



avgust 
crop protection

Многоканальный телефон
справочной службы
(бесплатно по России):
8-800-700-03-57

Офис: 129515, Россия, г. Москва,
ул. Цандера, д. 6, тел./факс:
(495) 787-84-99

Склад: 140054, Московская обл.,
Люберецкий р-н, г. Котельники,
мкрн Силикат, промзона, стр. 4,
тел.: (495) 647-07-49

dacha.avgust.com