

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ | 2024


avgust



БЫТЬ ПЕРВЫМИ!

ЗАЩИТА ОТ СОРНЯКОВ ДО 3-Х ЛЕТ!



250 г/л имазапир

Препарат для очистки участков не предназначенных под посев

- Полное уничтожение всех видов сорняков, включая самые злостные, и нежелательной древесно- кустарниковой растительности
- Системное действие и выраженная почвенная активность
- Отличная дождестойкость и низкая токсичность



Оглавление

О компании.....	6
Рекомендации садоводам и огородникам.....	7
Серия «Биоземледелие».....	11
Препараты от вредителей (инсектициды).....	29
Препараты от болезней (фунгициды)	54
Препараты от сорняков (гербициды).....	76
Адьювант.....	89
Комплексное удобрение.....	91
Регуляторы роста растений.....	93
Серия «БАУ».....	98
Серия «Двойная защита».....	102
Препараты от грызунов (родентициды).....	104
Препараты бытовой химии.....	106
Препараты бытовой химии марки ЭКО.....	119

Алфавитный указатель

А		Кротомет (дымовая шашка)	112	Рибав-Экстра	19
Адыо	90	Кротомет (гранулы)	121	Рэгги	96
Аминозол	13	Кукарача (гранулы)	110	С	
Б		Кукарача (гель)	111	Садовый вар	68
Батрайдер	31	Кукарача (приманка)	110	Синклер для картофеля и чеснока	69
Биотлин	30	Кукарача (спрей)	111	Синклер для цветочных культур	70
Биотлин БАУ	99	Кукарача Эко (гранулы)	122	Скарабей	47
Бомбер	33/55	Л		Скор	71
Бордоская жидкость	56	Лазурит	83	Слизнед Нео	116
В		Лазурит Т	84	Супер Кэт	105
Валлар	34	Лазурит Ультра	85	Сэмпай	48
Г		М		Т	
Герольд	35	Магнум	86	Табу	49
Геката	57	МатринБио	15	Табу ТРИО	50
Грейдер	77	МикроМикс	92	Танрек	51
Гризли	36	Миура	82	Танрек от тли	52
Гумат +7 йод	12	Молетокс	39	Топаз	73
Д		Мохофф	18	Топаз + Биотлин	103
Деймос	80	Муравьед	41	Трафик	97
Деймос газон	78	Муравьед №1	42	Ф	
Деймос (гель)	79	Муравьед Супер (гель)	114	Фитоверм	25
Деймос + Миура	81	Муравьед Супер (гранулы)	113	Фитозонт Хвойный	24
Ж		Муравьед Супер (приманка)	113	Фитолавин	23
Жукоед	37	Муравьед Эко (гранулы)	123	Фитомицин	22
З		Мухоед для овощных культур	43	Х	
Здоровая земля	58	Мухоед для цветочных растений	40	Хакер	87
Змеед Эко	121	Мухоед Супер (гранулы)	114	Хакер 300	88
И		Мухоед Супер (лента)	115	Хорус	74
Инсекта	116	О		Ц	
Инсекта (аэрозоль)	117	Ордан	61	Цветолокс БАУ	100
Инсайд	59	Осоед (гель)	115	Ципершок	117
Интрада	60	П		Ч	
К		Пиноцид	44	Чистоцвет	75
Кинмикс	38	Плантенол Нео	62	Чистоцвет + Биотлин	103
Клещевит	17	Побелка садовая	63	Чистоцвет БАУ	101
Клещевит Супер	108	Почкорост	95	Ш	
Клещевит Супер (спрей)	108	Провотокс	46	Шарпей	53
Клопоед	112	Профилактин Био	21	Я	
Комароед	109	Профилактин Лайт	45	Янтарин	27
Комароед Био	122	Р		Янтарин БАУ	28
Комароед Супер (аэрозоль)	109	Раёк	65		
Корень Супер	94	Раёк + Биотлин	103		
		Ракурс для хвойных культур	64		
		Ракурс для плодовых культур	66		
		Ревус	67		

ИННОВАЦИЯ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ!



125 г/л альфа-Циперметрина
+ 100 г/л имидаклоприда
+ 50 г/л клоотианидина

Универсальный препарат от широкого спектра вредителей

- Мгновенно определит и уничтожит насекомых на плодовых, ягодных, овощных, цветочных, декоративных культурах и винограде
- Действует при любой температуре, не смывается дождем уже через 2 часа после обработки
- Защищает растения на длительный срок



С нами расти легче



АО Фирма «Август» – крупнейшая российская компания по разработке и производству химических средств защиты растений, располагающая 60 представительствами в регионах России и 17 дочерними компаниями за рубежом. По версии РБК, **«Август»** входит в рейтинг 500 крупнейших компаний России. Бренд без преувеличения является признанным лидером и настоящим символом отрасли, что подтверждается, среди прочего, серьезными исследованиями международных аналитических компаний, в числе которых Kleffmann Group. В 2017 году **«Август»** стал лауреатом национальной премии **«Марка №1 в России»** в категории «Средства защиты растений» и подтвердил это звание в 2021 году, что свидетельствует о высочайшем доверии к продукции бренда со стороны отечественного потребителя.

«Август» также обладает серьёзной научной базой. Наши специалисты разработали более 100 новых рецептур и получили более 40 патентов на изобретения.

В 2020 году началась реализация большого проекта компании в подмосковном наукограде Черноголовка, где будет построен крупный современный научный центр. Он позволит осуществлять масштабные исследования по разработке инновационных препаратов и производить сверхэффективные средства защиты растений, опережающие время. Также Центр станет перспективной площадкой для обучения студентов.

В производственную базу компании входят завод **«Август-Вурнары»** в Чувашской Республике, завод **«Август-Бел»** в Республике Беларусь и новый завод **«Август-Алабуга»** в Татарстане, который был запущен в 2019 году. Он стал самой большой производственной площадкой **«Августа»**, его мощность способна обеспечить качественными средствами защиты растений треть рынка страны.

Для дачников России и стран ближнего зарубежья компания **«Август»** производит более 130 видов продукции. Каждый год продуктовая линейка продолжает расширяться за счёт выпуска новых препаратов от вредителей, болезней, сорняков, регуляторов роста. В ТОП продаж входят такие препараты как Лазурит, Жукоед, Профилактин Лайт, Бордоская жидкость, Табу и др. Успешно развивается новое направление препаратов бытовой химии **«Мир без вредителей»**. Муравьед Супер, Клещевит Супер и Клопоед уже завоевали доверие потребителей. Также в эту серию входят экологичные препараты, маркированные значком **«ЭКО»**. Продукция компании представлена во всех регионах Российской Федерации, а также в Республике Беларусь и Казахстане. Приобрести её можно в известных сетевых магазинах, таких как **«ОБИ»**, **«Леруа Мерлен»**, **«Максидом»**, **«Ашан»**, **«Глобус»** и др.

Компания **«Август»** гарантирует своим партнёрам высокое качество продукции, подтверждённое стандартами ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, всегда широкий ассортимент препаратов, доступные цены, бесперебойные поставки точно в срок, гибкую систему скидок и рекламную поддержку в центральных и региональных СМИ.

Оглавление

Алфавитный указатель

Рекомендации садоводам

БИО земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы роста

БАУ

Двойная защита





Родентициды

Бытовая химия

Бытовая химия ЭКО


Рекомендации садоводам и огородникам

avgust 
crop protection

Культура	Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки
	Комплексная защита от колорадского жука, проволочника и различных гнилей, антистрессовый эффект, увеличение размера клубней Колорадский жук, проволочник	Табу ТРИО	Обработка клубней перед посадкой
		Табу	Обработка клубней перед посадкой или дна борозды во время посадки
	Колорадский жук, картофельная коровка	Батрайдер, Танрек, Скарабей, Жукоед, Биотлин БАУ, Кинмикс, Фитоверм, Шарпей	Опрыскивание по мере появления вредителей
	Проволочник	Провотокс	Внесение гранул при посадке
	Фитофтороз, альтернариоз	Ордан, Раёк, Инсайд, Ревус	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней
	Ризоктониоз, фузариоз, гнили при хранении: фузариозная, фомозная, мокрая бактериальная гниль, альтернариозная гниль	Синклер	Обработка клубней перед посадкой и перед закладкой на хранение
	Подавление прорастания клубней при хранении	Трафик	Опрыскивание растений за 21-25 дней до сбора урожая
	Сорняки (амброзия, лебеда, марь, щирица и др.)	Лазурит, Лазурит Ультра	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы до 5 см
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.) Картофельная моль	Миура Молетокс, Шарпей	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние) Опрыскивание при появления вредителей
	Белокрылка, тли, клещи, трипсы, совка, хлопковая совка	Батрайдер, Биотлин, Биотлин БАУ, Танрек от тли, Клещевит, МатринБио, Фитоверм	Опрыскивание по мере появления вредителей
	Коричнево-мраморный клоп	Батрайдер	Опрыскивание в период вегетации
	Фитофтороз, альтернариоз	Инсайд*, Ордан, Раёк, Интрада, Ревус	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней
	Корневые гнили	Фитомицин	Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – с интервалом 15 дней
	Бактериальная гниль, чёрная бактериальная пятнистость	Фитомицин	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней
	Мучнистая роса	Интрада	Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней
	Сорняки (амброзия, лебеда, марь, щирица и др.)	Лазурит Т, Лазурит Ультра	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт или сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Миура*	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние)
	Перерастание рассады томатов и перцев	Рэгги	Опрыскивание рассады в фазе 2-4 листьев, последующие – с интервалом 5-8 дней, полив рассады под корень в фазе 3-4 листьев
	Белокрылка, тли, клещи, трипсы	Биотлин, Биотлин БАУ, Клещевит, Танрек от тли, Фитоверм, МатринБио	Опрыскивание по мере появления вредителей
	Пероноспороз (ложная мучнистая роса), антракноз, пятнистости	Ордан, Интрада	Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания, повторное – через 7-14 дней
	Корневые гнили	Фитомицин	Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – с интервалом 15 дней
	Мучнистая роса	Интрада	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 7-14 дней
	Листогрызущие гусеницы (капустная белянка, совка, моль), тли, блошки	Батрайдер, Герольд, Скарабей, МатринБио, Сэмпай, Кинмикс, Фитоверм, Шарпей	Опрыскивание по мере появления вредителей
	Крестоцветные блошки	Батрайдер, МатринБио	Опрыскивание по мере появления вредителей
	Капустная муха	Мухоед	Рассев гранул вокруг растений после посадки в период массовой яйцекладки
	Слизни, улитки	Слизнед Нео	Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
	Ложная мучнистая роса, альтернариоз	Интрада	Опрыскивание в период вегетации
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Миура	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние)
	Опрыскивание в период вегетации	Хакер 300	Опрыскивание многолетних двудольных сорняков в фазу розетки после высадки рассады в грунт
Перерастание рассады	Рэгги	Полив рассады под корень в фазе семейных листьев, последующие с интервалом 7 дней	

* находится в стадии регистрации

Культура	Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки
 Морковь	Муха морковная, листоблошка	Батрайдер, Шарпей	Опрыскивание в период вегетации
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Миура	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние)
	Слизни, улитки	Слизнед Нео	Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
 Лук, чеснок	Луковая муха	Табу Мухоед	Обработка лука-севка перед посадкой
	Трипсы	МатринБио	Внесение гранул в почву при посадке луковиц
	Пероноспороз (ложная мучнистая роса)	МатринБио	Опрыскивание в период вегетации
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Ревус, Инсайд	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней
	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Миура	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние)
	Подавление прорастания луковиц при хранении	Хакер 300	Опрыскивание культуры, начиная с фазы двух настоящих листьев. Вторая обработка через 3-4 недели
 Яблоня, груша	Предохранение коры от повреждений	Трафик	Опрыскивание растений за 14-21 день до сбора урожая
	Зимующие стадии медяниц, тлей, листовёрток, щитовок, клещей	Садовая побелка Садовый вар	Обработка стволов осенью или весной до распускания почек
	Калифорнийская щитовка, коричнево-мраморный клеп	Профилактик Био, Профилактик Лайт	Применение после обрезки
	Яблонный цветоед, медяницы, тли	Батрайдер	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 °C
	Листовёртки, моли, шелкопряд	Батрайдер, Биотлин, Кинмикс, Танрек от тли, МатринБио	Опрыскивание в период вегетации
	Плодожорка	Герольд, Кинмикс, Скарабей, Сэмпай, Фитоверм, Шарпей	Опрыскивание во время фазы набухания почек, далее – по мере необходимости
	Клещи	Герольд, Кинмикс, Скарабей, Сэмпай, Фитоверм, Шарпей	Опрыскивание во время начала появления гусениц
	Парша, мучнистая роса, пятнистости	Герольд, Кинмикс, Скарабей, Сэмпай, Фитоверм, Шарпей	Опрыскивание через 10-15 дней после цветения с последующей обработкой через 2 недели
	Пятнистости, парша, монилиоз	Клещевит, Фитоверм, МатринБио	Опрыскивание при появлении вредителей
	Монилиоз, бактериальный ожог	Геката, Раёк, Скор	Опрыскивание: 1-е – в фазе «розовый бутон», 2-е – после цветения, последующие – при необходимости с интервалом 10-14 дней
	Гнили плодов при хранении	Бордоская жидкость, Плантенол Нео, Хорус	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса», последующие – в период вегетации
	Ржавчина	Фитомицин	Опрыскивание в период вегетации в фазе обособления бутонов, цветения и далее – по мере необходимости
	Альтернариоз	Геката, Хорус	Опрыскивание в период созревания плодов
 Вишня, слива, персик	Предохранение коры от повреждений	Ракурс	Опрыскивание в период вегетации
	Зимующие стадии медяниц, тлей, листовёрток, щитовок, клещей	Плантенол Нео, Скор, Хорус	Опрыскивание до и после цветения с интервалом не более 14 дней
	Тли, долгоносики, плодожорка	Садовая побелка Садовый вар	Обработка стволов осенью или весной до распускания почек
	Вишнёвая муха	Профилактик Био, Профилактик Лайт	Применение после обрезки
	Коккомикоз, монилиоз, пятнистости, плодовая гниль	Батрайдер, Кинмикс	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 °C
	Кластероспориоз, курчавость листьев	Батрайдер	Опрыскивание при появлении вредителей
 Неплодоносящие сады	Американская белая бабочка	Батрайдер	Опрыскивание до или сразу после цветения
		Бордоская жидкость, Раёк, Хорус, Плантенол Нео, Скор	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса», последующие – в период вегетации
 Смородина, крыжовник	Зимующие стадии медяниц, тлей, листовёрток, щитовок, клещей	Скор	Опрыскивание до и после цветения с интервалом не более 14 дней
	Огнёвка, листовёртки, галлицы, пилильщики, клещи, пяденица	Молетокс	Опрыскивание по мере появления вредителей
	Тли	Профилактик Био, Профилактик Лайт	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 °C
	Мучнистая роса	Батрайдер, Кинмикс, Клещевит, МатринБио, Фитоверм	Опрыскивание при появлении вредителей
	Антракноз, пятнистости, ржавчина	Батрайдер, Биотлин, Биотлин БАУ, МатринБио, Танрек от тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая
	Антракноз, септориоз	Топаз	Опрыскивание до и сразу после цветения
	Бордоская жидкость	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса», последующие – в период вегетации	
	Геката	Опрыскивание: 1-е – в начале цветения, 2-е – в конце цветения – начале образования ягод	

Культура	Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки
 Земляника, малина	Слизни, улитки	Слизнед Нео	Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
	Образование усов	Рэги	Опрыскивание в начале фазы бутонизации и через 7 дней после первого опрыскивания
	Стимуляция роста, повышение урожайности	Янтарин, Янтарин БАУ	Опрыскивание в период массового цветения
	Двудольные сорняки (осот, одуванчик, бодяк и др.)	Хакер 300	Опрыскивание вегетирующих сорных растений после сбора урожая
 Виноград	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Профилактин Лайт, Профилактин Био	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 °С
	Листовёртки, листовая филлоксера	Батрайдер, Скарабей, Шарпей, МатринБио	Опрыскивание в фазе разрыхления соцветий и фазе завязывания ягод
	Трипсы, цикадки, совки	МатринБио	Опрыскивание при появлении вредителей
	Клещи (войлочный, паутинный и др.)	МатринБио	Опрыскивание при появлении вредителей
	Слизни, улитки	Слизнед Нео	Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
	Оидиум	Геката, Интрада	Опрыскивание до и после цветения с интервалом 10-14 дней
	Чёрная пятнистость, чёрная гниль	Инсайд, Геката	Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации-цветения, 2-е – до смыкания ягод в грозди, далее с интервалом 10-14 дней
Милдью	Инсайд, Интрада	Опрыскивание до и после цветения с интервалом 10-14 дней	
 Хвойные растения	Пилильщики, клещи, щитовки, хермеса, тли, ложнощитовки, мучнистые червецы, листовёртки	Пиноцид	Опрыскивание при появлении вредителей
	Трипсы	Батрайдер	Опрыскивание при появлении вредителей
	Личинки майского жука	Валлар	Обмакивание корней сеянцев (саженцев) перед высадкой. Внесение гранул на глубину 5-10 см через 25-30 дней после высадки растений
	Снежное и обыкновенное шютте, ржавчина	Ракурс	Опрыскивание при первых признаках заболевания
	Стимулирование корнеобразования	Фитозонт хвойный	Обработка черенков и корневой системы саженцев и сеянцев
	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Профилактин Лайт, Профилактин Био	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 °С
 Цветочно-декоративные культуры	Тли, клещи, трипсы, пилильщики, белокрылка	Батрайдер, Биотлин, Клещевит, МатринБио, Фитоверм, Танрек от тли, Цветолукс БАУ	Опрыскивание при появлении вредителей
	Агатая совка, совка-гамма, пяденицы, боярышница, бражник	Герольд	Опрыскивание при появлении вредителей
	Почвообитающие вредители	Мухоед	Внесение гранул на поверхность почвы вокруг растений с последующим рыллением
	Слизни, улитки	Слизнед Нео	Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
	Ржавчина, мучнистая роса, пятнистости	Ракурс, Скор, Топаз, Чистоцвет, Чистоцвет БАУ	Опрыскивание при первых признаках заболевания
	Гнили (фузариоз, пенициллёз и др.)	Здоровая земля	Полив почвы в период вегетации
	«Чёрная ножка»	Здоровая земля	Дезинфекция почвы методом полива после высева семян
	Американская белая бабочка	Молетокс	Опрыскивание при появлении вредителей
	Активизация ростовых процессов, улучшение качественных и декоративных характеристик растений	Янтарин БАУ	Опрыскивание растений в период активного роста с интервалом 15-20 дней
	 Комнатные растения в т.ч. орхидеи	Тли, клещи, трипсы, белокрылка	Биотлин, Клещевит, МатринБио, Цветолукс БАУ, Фитоверм
Мучнистая роса, ржавчина, пятнистости		Топаз, Чистоцвет	Опрыскивание при первых признаках заболевания
«Чёрная ножка»		Здоровая земля	Полив почвы в горшках в период вегетации
Активизация ростовых процессов, улучшение качественных и декоративных характеристик растений		Янтарин БАУ	Опрыскивание растений в период активного роста с интервалом 15-20 дней
Пробуждение спящих почек, формирование новых побегов и цветоносов, стимуляция цветения		Почкорост	Нанесение препарата тонким слоем на спящую почку

Другое	Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки
Газон 	Сорняки (осот, ромашка, одуванчик, клевер, щавель, подорожник, горцы и др.)	Деймос для газона, Хакер, Хакер 300	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса
		Деймос гель, Мохофф	Точечная обработка сорняков
	Мхи	Мохофф	Опрыскивание засоренных участков с последующим посевом газонной культуры
	Предотвращение быстрого перерастания, увеличение густоты травостоя	Рэгги	Опрыскивание: 1-е после первого скашивания травы, 2-е и 3-е с интервалом 20-25 дней
Многоядные вредители 	Медведка	Гризли	Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см в период вегетации
	Личинки майского жука	Валлар	Обмакивание корней сеянцев (саженцев) перед высадкой. Внесение гранул на глубину 5-10 см через 25-30 дней после высадки растений
	Слизни, улитки	Слизнед Нео	Рассев гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
	Садовые и домовые муравьи	Муравьед, Муравьед №1	Полив путей передвижения муравьёв, отмопок, щелей между плитками
		Муравьед Супер	Раскладка гранул на подложки в местах скопления муравьёв
Осы	Осоед	Нанесение геля на подложки и расстановка в местах скопления и обнаружения ос	
Сорная растительность 	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (марь, осоты, крапива и др.)	Деймос, Магнум	Обработка вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев у однолетних и при высоте в 10-15 см многолетних
	Злостные сорняки	Деймос, Деймос+Миура, Магнум	Предпосевная обработка участка, опрыскивание сорняков вдоль дорожек и заборов
	Участки, не предназначенные под посев (посадку) культурных растений (обочины дорог, вдоль изгороди и т.д.)	Грейдер, Деймос, Деймос+Миура, Магнум	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам
	Сорняки в посадках культурных растений	Деймос гель	Точечная обработка поверхности листьев сорняков
Регуляторы роста, удобрения 	Повышение урожайности, устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, стимулирование роста, повышение продолжительности цветения и декоративных качеств цветочных культур	Аминозол, Гумат+7 Йод, МикроМикс, Рибав-Экстра, Ростомонт, Янтарин, Янтарин БАУ, Фитозонт универсальный	Предпосевная обработка, обработка до и после цветения
	Стимулирование корнеобразования	Корень Супер, Рибав-Экстра, Фитозонт хвойный	Обработка черенков и корневой системы саженцев и сеянцев
	Предотвращение перерастания, улучшение качества рассады	Рэгги	Опрыскивание или полив растений под корень
Грызуны, кроты, змеи 	Мышевидные грызуны (крысы, мыши, полёвки)	Super-Cat	Раскладка приманок в местах скопления (обитания) вредителей
		Кротомет	Раскладка гранул в кротовины
		Кроты	Кротомет ЭКО
	Кротомет шашка		Заделка дымящей шашки в кротовины
Змеи	Змеед ЭКО	Раскладка шариков на почву на расстоянии 1 м друг от друга	
Пустые погреба, подвалы, теплицы 	Болезни (фузариоз, фомоз и др. гнили)	Бомбер	Фумигация помещений перед закладкой продукции на хранение. Фумигация пустых теплиц перед посевом семян, посадкой растений
	Вредители (моли, клещи, мокрицы, кивсяки, трипсы, подвальные слизни, муравьи и др.)		

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО



Серия «Биоземледелие»



Гумат +7 ЙОД

Удобрение на основе гуминовых кислот для обработки семян и подкормки растений

- увеличивает всхожесть и энергию прорастания семян
- улучшает структуру и повышает плодородие почвы
- обеспечивает получение высоких урожаев
- способствует накоплению плодами питательных веществ и витаминов
- экономично: 10 г препарата на 100 л воды

Срок годности	10 лет
Объем упаковки	25 г (пакет)
Действующее вещество	смесь калиевых и/или натриевых солей гуминовых кислот - 75%, К - 5%, медь - 0,2%, Zn - 0,2%, Mn - 0,17%, I - 0,005%, Mo - 0,018%, Co - 0,02%, Fe - 0,4%, B - 0,2%

КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Предпосевное замачивание семян на 14-24 часа, луковок на 6-8 часов	0,5-1 г/л воды	-	1
	Корневая подкормка в течение периода вегетации с интервалом в 14-15 дней, начиная с фазы появления всходов или высадки рассады	1,5-2 г/10 л воды	4-5 л/1 м ²	3-4
 ЦВЕТОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Предпосевное замачивание семян на 14-24 часа, луковок на 6-8 часов, саженцев на 2-3 часа, черенков на 24 часа	0,5-1 г/л воды	-	1
	Корневая подкормка в течение периода вегетации с интервалом в 7-10 дней, начиная с фазы появления всходов или высадки рассады	1,5-2 г/10 л воды	4-5 л/1 м ²	5-6
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Корневая подкормка в период активного роста с марта по сентябрь: 1 раз в 10-15 дней, с октября по февраль: 1 раз в 1-1,5 месяца	1,5-2 г/10 л воды	100-200 мл/ молодое растение, 1-1,5 л/взрослое	2-3
 ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ	Замачивание черенков на 24 часа, саженцев с открытой корневой системой на 2-3 часа	0,5-1 г/л воды	-	1
	Корневая подкормка осенью или при посадке	3 г/10 л воды	10-50 л/растение	-
	Подкормка в течение периода вегетации с интервалом в 10-15 дней, начиная с фазы возобновления вегетации	1,5-2 г/10 л воды	10-50 л/растение (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м ² кустарников, 2-10 л/дерево (некорневая подкормка)	3-4
 ЗЕМЛЯНИКА	Подкормка с интервалом 10-15 дней в фазу возобновления вегетации и после сбора урожая	0,5-2 г/10 л воды	4-5 л/1 м ² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м ² (некорневая подкормка)	1-2

Подробные рекомендации по применению см. на упаковке



АМИНОЗОЛ

Жидкое органическое азотное удобрение из продуктов животного происхождения с полным комплексом аминокислот

- повышает урожайность
- стимулирует рост растений
- защищает от стрессов
- улучшает деление клеток и развитие корневой системы
- помогает усваивать питательные вещества целыми «строительными блоками»

Срок годности 2 года
Объём упаковки 5 мл (пластиковая ампула); 100 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество N – 9%, аминокислоты – 55%, P



КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Замачивание семян на 12-24 часа, корневой системы рассады перед посадкой на 1-2 часа	5 мл/500 мл воды	–	1
	Полив под корень при посадке	5 мл/500 мл воды	0,05-2 л/растение (зависит от размеров)	1
	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 КАРТОФЕЛЬ	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4



КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Замачивание корневой системы саженцев перед посадкой на 1-2 часа	5 мл/500 мл воды	–	1
	Полив под корень при посадке	5 мл/500 мл воды	0,05-2 л/растение (зависит от размеров)	1
	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	10-20 л/растение (корневая подкормка) 1,5-2 л/10 м ² кустарников, 2-10 л/дерево (некорневая подкормка)	3-6
ЗЕМЛЯНИКА	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м ² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м ² (некорневая подкормка)	3-4
ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м ² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м ² (некорневая подкормка)	3-4
ЦВЕТОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Замачивание семян на 12-24 часа. Замачивание корневой системы рассады (саженцев) перед посадкой на 1-2 часа	5 мл/500 мл воды	–	1
	Полив под корень при посадке	5 мл/500 мл воды	0,05-2 л/растение (зависит от размеров)	1
	Подкормка цветочных культур в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м ² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м ² (некорневая подкормка)	3-4
	Подкормка декоративных культур в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	10-20 л/растение (корневая подкормка) 1,5-2 л/10 м ² кустарников, 2-10 л/дерево (некорневая подкормка)	3-6
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ защищённый грунт	Подкормка	5 мл/2 л воды	до смачивания земляного кома (корневая подкормка) до равномерного смачивания всей поверхности листьев (некорневая подкормка)	1 раз/7-10 дней (март – октябрь), 1 раз/месяц (ноябрь – февраль)
ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ, ОРХИДЕИ	Подкормка	5 мл/2 л воды	до смачивания земляного кома или 100-200 мл/горшок (зависит от размера) (корневая подкормка) до равномерного смачивания всей поверхности листьев (некорневая подкормка)	1 раз/7-10 дней (март – октябрь), 1 раз/месяц (ноябрь – февраль)

МатринБио®

Биологический препарат для защиты овощных, плодовых, ягодных, цветочных культур и комнатных растений от клещей и др. вредителей

- имеет растительное происхождение
- максимальная безопасность при применении на зеленых и тепличных культурах
- уничтожает разные стадии развития вредителей: яйца, личинки, взрослые особи
- последняя обработка возможна за 3 дня до сбора урожая

Срок годности 2 года
 Объем упаковки 9 мл, 45 мл (флакон)
 Действующее вещество 5 г/л матрина, ВР



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША, АЙВА	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объема кроны)	3	3
 СМОРОДИНА	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	3	3
 ВИНОГРАД	Гроздевая листовёртка, войлочный клещ (зудень), паутинный клещ, трипсы, цикадки, совки	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	3	3
 ТОМАТ, ОГУРЕЦ открытого грунта	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/10 л воды	3 л/100 м²	3	3
 ТОМАТ, ОГУРЕЦ защищенного грунта	Тепличная белокрылка, паутинный клещ, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/10 л воды	3 л/100 м²	3	3

! Для усиления активности МатринБио в рабочий раствор рекомендуется добавление препарата Адыю



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	3	3
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ	Капустная моль, капустная совка, капустная и репная белянки	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	3	3
КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ	Крестоцветные блошки, тли	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	3	3
ЛУК	Луковая муха, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	3	3
СПАРЖА	Спаржевый листоед	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	3	3
РУККОЛА	Крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	3	3
САЛАТ, ШПИНАТ	Тли, совки	Опрыскивание в период вегетации	10-15 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	3	3
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Паутинный клещ, тли	Опрыскивание при появлении вредителей	1,5 мл/ 1 л воды	50-500 мл/растение <i>(в зависимости от размера)</i>	3	–
РОЗА защищённого грунта	Паутинный клещ, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	1-1,5 мл/ 1 л воды	1 л/10 м²	3	–
РОЗА открытого грунта	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации	1-1,5 мл/ 1 л воды	1 л/30-35 м²	3	–

! Для усиления активности МатринБио в рабочий раствор рекомендуется добавление препарата Адью



Клещевит®

Биологический препарат для борьбы с клещами на различных культурах

- обладает высокой скоростью воздействия – клещи прекращают питание через 6-8 часов, а их полная гибель наступает через 3-4 дня
- имеет минимальный срок ожидания – плоды можно употреблять в пищу уже через 3 дня после обработки
- не вызывает привыкания у вредителей

Срок годности	2 года
Объём упаковки	4 мл (пластиковая ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	2 г/л аверсектина С, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 СМОРОДИНА	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 1 л/куст	2	3
 ЯБЛОНЯ	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/1 л воды	до 5 л/дерево	2	3
 ОГУРЕЦ, ТОМАТ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН <i>защищённого грунта</i>	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	3	3
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ <i>защищённого грунта</i>	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	3	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ <i>открытого грунта</i>	Паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей	2 мл/1 л воды	до 10 л/100 м ²	4	–
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей	2 мл/1 л воды	0,1 л/1 м ²	4	–



Мохофф


Биогербицид для борьбы со мхом и нежелательной травянистой растительностью

- уничтожает только те части растения, на которые был нанесен
- обладает высокой скоростью воздействия: 2-3 часа после проведения обработки
- мох и сорняки «сгорают» в течение одного дня
- быстро разлагается в почве, безопасен для человека и окружающей среды

Срок годности	2 года
Объем упаковки	100 мл (флакон)
Действующее вещество	525 г/л пеларгоновой кислоты, МКЭ



НОВИНКА
2023

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ГАЗОНЫ	Мхи, лишайники, нежелательная травянистая растительность	Опрыскивание засоренных участков с последующим подсевом газонной культуры	100-200 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1



Рибав®•Экстра

Природный регулятор роста и корнеобразователь

- содержит уникальный комплекс биологически активных веществ
- обеспечивает 99% укореняемость любых культур
- улучшает приживаемость растений при посадке и пересадке
- омолаживает старые растения
- усиливает ростовые процессы

Срок годности	3 года
Объём упаковки	1 мл (ампула)
Действующее вещество	0,00152 г/л L-аланина + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты, P



КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 КАРТОФЕЛЬ	Повышение полевой всхожести клубней, ранней и общей урожайности, устойчивости к фитофторозу и вирусным заболеваниям	Предпосадочная обработка клубней	0,1 мл/1 л воды	1 л/100 кг	1
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	0,1 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1
 ОГУРЕЦ открытого и защищённого грунта	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут	0,1 мл/1 л воды	100 мл/100 г	1
		Полив под корень в фазе 3-4 настоящих листьев	1 мл/10 л воды	100 мл/1 растение	1
 ТОМАТ открытого и защищённого грунта	Повышение энергии прорастания и всхожести, увеличение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут	0,1 мл/1 л воды	100 мл/50 г семян	1
		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 4-5 настоящих листьев, 2-е – через 2 недели после 1-го опрыскивания, 3-е – перед цветением	0,1 мл/10 л воды	4 л/100 м²	3
 ЛУК РЕПЧАТЫЙ (семена), СВЕКЛА СТОЛОВАЯ	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут	0,1 мл/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
		Полив под корень через 1,5 месяца после посева	1 мл/10 л воды	4-5 л/10 м²	1



КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЛУК РЕПЧАТЫЙ (севок)	Ускорение роста, увеличение урожайности	Замачивание севка перед посевом на 30 минут	1 мл/1 л воды	1 л/0,5 кг	1
		Полив под корень через 1,5 месяца после посадки	1 мл/10 л воды	4-5 л/10 м²	1
 ГОРОХ	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности зелёной массы и семян. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание семян перед посевом на 30 минут	0,1 мл/1 л воды	100 мл/50 г семян	1
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	0,01 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1
 КАПУСТА	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут	0,1 мл/1 л воды	100 мл/50 г семян	1
		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 настоящих листьев, 2-е – через 2 недели после 1-го опрыскивания, 3-е – в фазе завязывания кочана	0,1 мл/10 л воды	4 л/100 м²	3
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (бегония вечноцветущая, бегония клубневая, тагетес отклонённый, виола гибридная), ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных характеристик растений	Полив растений под корень: 1-й – в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-й – после пикировки рассады	1 мл/10 л воды	4 л/1 м²	2
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	1 мл/10 л воды	4 л/100 м²	1
 ВИШНЯ, ГРУША, ЯБЛОНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА, ИРГА, ЖИМОЛОСТЬ, РЯБИНА КРАСНАЯ, АРОНИЯ, МАЛИНА, ЕЖЕВИКА, СИРЕНЬ, МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЙ ГИБРИД	Стимулирование корнеобразования, активизация ростовых процессов	Полив при посадке	1 мл/10 л воды	1-5 л/растение	1
		Замачивание зелёных черенков или корневой системы саженцев на 18 часов	1 мл/10 л воды	1 л/100 черенков	1
 Ель (сеянцы)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста	0,2 мл/1 л воды	3 л/1 м²	1
		Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива	1 мл/1 л воды	6 л/100 м²	1
		Замачивание семян перед посевом на 18 часов	1 мл/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
 СОСНА (сеянцы)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста	0,2 мл/1 л воды	3 л/1 м²	1
		Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива	1 мл/1 л воды	6 л/100 м²	1
		Замачивание семян перед посевом на 18 часов	0,2 мл/1 л воды	200 мл/100 г семян	1

Профилактин® БИО

Комбинированный препарат для защиты плодовых, ягодных, декоративных культур и винограда от широкого спектра зимующих вредителей

- содержит инсектицид растительного происхождения
- уничтожает разные стадии развития вредителей
- действует уже при температуре от +4 °С
- защищает культуры на срок не менее 30 дней



Срок годности 2 года
Объём упаковки 500 мл (флакон)
Действующее вещество 658 г/л вазелинового масла + 2,2 г/л матрина, ВЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША, АЙВА	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, молей, медяницы, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	1-5 л/дереву (зависит от возраста и объёма кроны)	1	–
 ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	1-5 л/дереву (зависит от возраста и объёма кроны)	1	–
 ВИНОГРАД	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста)	1	–
 СМОРОДИНА	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста)	1	–
 КРЫЖОВНИК	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста)	1	–
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста)	1	–







Фитомицин®

Биологический препарат для борьбы с корневыми гнилями

- аналог природного антибиотика, выделенного из почвенных бактерий
- защищает от бактериальных и грибных болезней томаты, огурцы, а также плодовые культуры
- гарантирует получение экологически чистой безопасной для здоровья человека продукции



Срок годности	1 год
Объём упаковки	4 мл (пластиковая ампула)
Действующее вещество	БА 120 000 ЕА/мл, 32 г/л фитобактериомицина – комплекс стрептотрициновых антибиотиков, ВРК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТ <i>открытого грунта</i>	Бактериальная верхняя гниль, чёрная бактериальная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней	4 мл/ 2 л воды	2 л/20 м²	2	–
 ТОМАТ <i>защищённого грунта</i>	Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля	Полив рассады под корень 0,2% концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней	4 мл/ 2 л воды	30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/растение (на постоянном месте)	2	–
 ОГУРЕЦ <i>защищённого грунта</i>	Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное и трахеомикозное увядание	Полив рассады под корень 0,2% концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней	4 мл/ 2 л воды	30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/растение (на постоянном месте)	2	–
	Угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов	4 мл/ 2 л воды	2 л/20 м²	1-2	–
 ЯБЛОНЯ	Бактериальный ожог	Опрыскивание в период вегетации в фазы обособления бутонов, цветения, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром до 4-5 см	4 мл/ 2 л воды	2-5 л/дерево	4	–





Фитолавин®

Биологический препарат для борьбы с бактериальными и грибными болезнями плодовых и овощных культур

- гарантирует получение экологически чистой безопасной для здоровья продукции
- эффективен против корневых гнилей, монилиоза, бактериозов, пятнистостей и др.
- можно применять за 2 дня до сбора урожая

Срок годности	1 год
Объём упаковки	50 мл (флакон)
Действующее вещество	БА 120 000 ЕА/мл, 32 г/л фитобактериомицина – комплекс стрептотрициновых антибиотиков, ВРК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Бактериальный ожог	Опрыскивание в период вегетации в фазы обособления бутонов, цветения, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром до 4-5 см	20 мл/10 л воды	2-5 л/дерево	4	-
 ТОМАТ <i>защищённого грунта</i>	Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля	Полив рассады под корень 0,2% концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней	20 мл/10 л воды	30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/растение (на постоянном месте)	2	-
 ТОМАТ <i>открытого грунта</i>	Бактериальная вершинная гниль, чёрная бактериальная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней	20 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	2	-
 ОГУРЕЦ <i>защищённого грунта</i>	Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное и трахеомикозное увядание	Полив рассады под корень 0,2% концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней	20 мл/10 л воды	30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/растение (на постоянном месте)	2	-
	Угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов	20 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1-2	-



Фитозонт® ХВОЙНЫЙ

Специализированный высокоэффективный природный укоренитель

- обеспечивает 99% укореняемость хвойных культур
- улучшает приживаемость при посадке и пересадке
- усиливает ростовые процессы



Срок годности	3 года
Объём упаковки	1 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	0,00152 г/л L-аланина + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты, P

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЕЛЬ	Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста	0,2 мл (6 капель)/1 л воды	3 л/1 м²	1
		Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива	1 мл/1 л воды	6 л/100 м²	1
 СОСНА	Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста	0,2 мл (6 капель)/1 л воды	3 л/1 м²	1
		Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива	1 мл/1 л воды	6 л/100 м²	1





Фитоверм®

Биопрепарат для борьбы с комплексом вредителей на различных культурах

- высокая скорость воздействия – насекомые прекращают питание уже через 6-8 часов, полная гибель вредителей наступает через 3-4 дня
- применяется также для защиты от клещей
- имеет минимальные сроки до сбора урожая

Срок годности	2 года
Объём упаковки	4 мл (пластиковая ампула); 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество	2 г/л аверсектина С, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 СМОРОДИНА	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 1 л/куст	2	3
	Пяденицы, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/1 л воды	до 1 л/куст	2	3
 ЯБЛОНЯ	Клещи, пяденицы листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/1 л воды	до 5 л/дерево	2	3
	Яблонная плодоярка, совки	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 5 л/дерево	1	3
 КАПУСТА	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	16 мл/4 л воды	до 4 л/100 м ²	2	3
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/4 л воды	до 4 л/100 м ²	3	1



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
ОГУРЕЦ, ТОМАТ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН защищённого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/1 л воды	до 10 л/100 м²	2	3
	Персиковая, бахчевая тли	Опрыскивание в период вегетации	8 мл/1 л воды	до 10 л/100 м²	3	3
	Табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/1 л воды	до 10 л/100 м²	3	3
ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ защищённого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 10 л/100 м²	3	–
	Зелёная розанная тля	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/1 л воды	до 10 л/100 м²	3	–
	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации	8 мл/1 л воды	до 10 л/100 м²	3	–
ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 10 л/100 м²	4	–
	Тли	Опрыскивание в период вегетации	8 мл/1 л воды	до 10 л/100 м²	4	–
	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/1 л воды	до 10 л/100 м²	4	–
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей	2 мл/1 л воды	0,1 л/1 м²	4	–
	Тли	Опрыскивание по мере появления вредителей	2 мл/0,25 л воды	0,1 л/1 м²	4	–
	Трипсы	Опрыскивание по мере появления вредителей	2 мл/0,2 л воды	0,1 л/1 м²	4	–



Янтарин®

Природный регулятор роста плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур

- ускоряет сроки цветения и созревания
- увеличивает урожайность, улучшает качество продукции
- повышает устойчивость растений к поражению болезнями
- обладает антистрессовыми свойствами, оказывая положительное действие на растения в условиях засухи, жары, заморозков, излишней влажности
- улучшает усвоение питательных веществ из почвы

Срок годности	2 года
Объём упаковки	100 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество	5 г/л янтарной кислоты, ВРК

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЗЕМЛЯНИКА	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период массового цветения	50 мл/ 4 л воды	4 л/100 м²	1	-
 ВИНОГРАД	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации	130 мл/ 10 л воды	10 л/100 м²	1	-
 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период массового цветения	50 мл/ 10 л воды	10 л/100 м²	1	-
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (однолетние)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных и декоративных характеристик растений	Полив под корень: 1-й – в фазе 2-х настоящих листьев, 2-й, 3-й и 4-й – с интервалом 20 дней	15 мл/ 10 л воды	10 л/1 м²	4	-
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (многолетние)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных и декоративных характеристик растений	Полив под корень: 1-й – весной в фазе возобновления вегетации, 2-й и 3-й – с интервалом 20 дней	30 мл/ 10 л воды	10 л/1 м²	3	-





Янтарин® БАУ

Готовый к применению природный регулятор роста для комнатных растений и других цветочных культур


- активизирует рост корней и новых побегов, ускоряет развитие, способствует пышному цветению
- обладает антистрессовыми свойствами, оказывая положительное действие на растения в условиях неблагоприятной окружающей среды

Срок годности	2 года
Объём упаковки	500 мл, 700 мл (флакон с курковым распылителем, с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество	0,05 г/л янтарной кислоты, ВР

НОВИНКА
2023

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (многолетние)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных и декоративных характеристик растений	Опрыскивание растений: 1-е – весной в фазе возобновления вегетации, 2-е и 3-е – с интервалом 20 дней	Разбавление водой не требуется	500 мл/7-21 растение	3	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРХИДЕИ (горшечные комнатные растения)	Активизация ростовых процессов, улучшение качественных и декоративных характеристик растений	Опрыскивание растений в период активного роста с интервалом 15-20 дней	Разбавление водой не требуется	500 мл/7-21 растение	3	–
 СМОРОДИНА	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение рожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации	Разбавление водой не требуется	700 мл/4-8 растений	1	–
 ТОМАТ, ОГУРЕЦ защищённого грунта	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период массового цветения	Разбавление водой не требуется	700 мл/10-30 растений	1	–
 ЗЕМЛЯНИКА	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период массового цветения	Разбавление водой не требуется	700 мл/25 м ²	1	–





Препараты от вредителей ИНСЕКТИЦИДЫ

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО



Биотлин®

Системный препарат для уничтожения различных видов тли на плодовых, ягодных, овощных и цветочных культурах

- эффективен против насекомых, скрытоживущих и питающихся на нижней стороне листа
- обладает высокой скоростью воздействия – эффект от обработки наблюдается уже через несколько часов
- не вызывает привыкания у вредителей

Срок годности 4 года
Объём упаковки 3 мл (ампула); 9 мл (флакон)
Действующее вещество 200 г/л имидаклоприда, ВРК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОГУРЦЫ И ТОМАТЫ защитённого грунта	Тли, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1	3
 ЯБЛОНЯ	Тли	Опрыскивание в период вегетации	3 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта дерева)	1	60
	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта дерева)	1	60
 СМОРОДИНА	Тли	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 0,5 до 1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	60
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Тли, цикадки, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1	–



Батрайдер®

Инновационный универсальный препарат от комплекса вредителей

- обладает высокой скоростью воздействия и длительной защитой
- уничтожает 32 вида вредителей
- не имеет аналогов
- применяется на плодовых, ягодных, овощных, цветочных, декоративных культурах и винограде

Срок годности 3 года
Объём упаковки 10 мл (флакон)
Действующее вещество 125 г/л альфа-циперметрина + 100 г/л имидаклоприда + 50 г/л клотианидина, СК



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Яблонный цветоед, калифорнийская щитовка, тли, коричнево-мраморный клоп*	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объёма кроны)	1	20
 АЙВА, ГРУША	Коричнево-мраморный клоп*	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объёма кроны)	1	20
 ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА	Коричнево-мраморный клоп*	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объёма кроны)	1	20
 ВИНОГРАД	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	20
 ВИШНЯ	Тли, вишнёвая муха, вишнёвый долгоносик	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объёма кроны)	1	20
 СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ	Тли, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	0,5-1,0 л/куст	1	30

*находится в стадии регистрации



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
КАПУСТА	Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1	20
ТОМАТ открытого грунта	Хлопковая совка, коричнево-мраморный клоп*	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1	20
ОГУРЕЦ защищённого грунта	Тли, трипсы, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/ 10 л воды	10 л/ 100 м²	1	3
МОРКОВЬ	Морковная муха	Опрыскивание в период откладки яиц	2 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1	7
КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1	20
ЦВЕТочНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1	–
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объёма кроны)	1	–
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	1	–

*находится в стадии регистрации

Бомбер®

Дымовая шашка для обработки погребов и теплиц

- не имеет аналогов, содержит 2 компонента – фунгицид и инсектицид
- активна против болезней (фузариоза, фомоза и др.), вредителей (картофельной моли, клещей, мокриц, кивсяков, трипсов, слизней, муравьев и др.), а также грызунов
- образующийся дым проникает в труднодоступные места

Срок годности 2 года
Объем упаковки 5 г (шашка)
Действующее вещество 300 г/кг тиабендазола + 130 г/кг циперметрина, ДШ



ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ПУСТЫЕ ПОГРЕБА, ПОДВАЛЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	Возбудители болезней, вредные членистоногие	Фумигация пустых помещений перед закладкой продукции на хранение	5 г (1 шашка)/20 м ³	1
 ПУСТЫЕ ПАРНИКИ И ТЕПЛИЦЫ*	Трипсы, мокрицы, муравьи, возбудители грибных и бактериальных болезней	Фумигация пустых помещений перед посевом семян, посадкой растений	5 г (1 шашка)/20 м ³	1

После обработки выдержать помещение закрытым 3 дня, затем проветривать в течение 2 дней.

*зарегистрировано в республике Беларусь




Валлар®

Первый препарат для защиты от личинок майского жука (хруща) в личных подсобных хозяйствах

- предотвращает гибель молодых деревьев
- увеличивает приживаемость саженцев
- эффект проявляется уже через несколько часов после контакта с вредителем



Срок годности 3 года
Объем упаковки 50 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 <p>САЖЕНЦЫ И СЕЯНЦЫ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ, ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР</p>	<p>Личинки майского и других видов хрущей, проволочники и ложнопроволочники</p>	<p>Поверхностное внесение гранул препарата после высадки растений в грунт с последующей заделкой на глубину 5-10 см</p>	<p>40-50 г/10 м²</p>	<p>2</p>	<p>–</p>



Герольд®

Уникальный препарат от яблонной плодожорки, боярышницы и других вредителей

- нарушает развитие яиц и личинок насекомых
- защищает не менее 14 дней
- активен в отношении гусениц листовёрток, пядениц, бражника, различных совок, молей и др.
- применяется на плодовых, овощных, декоративных и цветочных культурах



Срок годности 3 года
Объём упаковки 5 мл (пластиковая ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 240 г/л дифлубензурана, ВСК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	до 1-5 л/дерево (в зависимости от объёма кроны)	2	40
 СМОРОДИНА	Смородинная почковая моль, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	1	30
 КАПУСТА	Капустная совка, белянки, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	2-4 л/100 м²	1	30
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Пяденицы, боярышница, бражник	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	1	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Агатовая совка, совка-гамма, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	2-4 л/100 м²	1	–



Гризли®

Оригинальный препарат-приманка для защиты картофеля, овощных, цветочных и других культур от медведки

- уничтожает как взрослых насекомых, так и их личинок в течение первых суток после обработки
- удобная в применении гранулированная форма
- специальные вкусовые добавки обеспечивают отличную поедаемость приманки
- гарантирует длительную защиту – не менее трёх недель



Срок годности	2 года
Объём упаковки	100 г (пакет)
Действующее вещество	40 г/кг диазинона, Г

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ <i>(кроме раннеспелых сортов)</i>	Медведка	Внесение гранул в почву при высадке клубней на глубину 2-5 см	20 г/10 м ²	1	60
 КАПУСТА <i>(кроме раннеспелых сортов)</i>	Медведка	Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см в период высадки рассады, при необходимости повторно через 10-14 дней	20 г/10 м ²	2	60
 ЗЕМЛЯНИКА <i>(после сбора урожая)</i>	Медведка	Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см после сбора урожая	20 г/10 м ²	2	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Медведка	Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см в период вегетации	20 г/10 м ²	2	–



Жукоед®

Уникальный трёхкомпонентный препарат от колорадского жука

- содержит три активных вещества с разными механизмами действия
- воздействует даже на особи, резистентные к одному из компонентов
- высокая активность при различных температурах
- полная гибель насекомых наступает за 24 часа

Срок годности 3 года
Объём упаковки 9 мл (флакон)
Действующее вещество 125 г/л альфа-циперметрина + 100 г/л имидаклоприда + 50 г/л клотианидина, СК



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	20



Кинмикс®

Препарат от комплекса вредителей на плодовых, ягодных и овощных культурах

- обладает широким спектром действия, уничтожает различные виды вредных насекомых
- защищает растения на срок до двух недель
- имеет низкие нормы расхода



Срок годности 5 лет
Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 50 г/л бета-циперметрина, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА	Тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	2 мл/5 л воды	до 3 л/дерево <i>(зависит от возраста и сорта дерева)</i>	2	30
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодожорка, листовёртки, тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	2 мл/5 л воды	до 5 л/дерево <i>(зависит от возраста и сорта дерева)</i>	2	20
	Яблонная медяница, яблонный цветоед	Опрыскивание в период бутонизации	2 мл/5 л воды	до 3 л/дерево <i>(зависит от возраста и сорта дерева)</i>	2	20
 СМОРОДИНА	Листовёртки, тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	2 мл/5 л воды	0,5-1 л/куст	2	20
 КРЫЖОВНИК	Пилильщики, тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	2 мл/5 л воды	0,5-1 л/куст	2	20
 КАПУСТА	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	2-3 мл/4 л воды	до 4 л/100 м ²	1	20
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	1,5-2 мл/4 л воды	до 4 л/100 м ²	1	20



Молетокс®

Надежная защита от картофельной моли и американской белой бабочки

- действие препарата заметно уже через 30 минут
- полная гибель вредителей наступает за 1,5-2 часа
- защищает растения на срок не менее двух недель
- уничтожает гусениц на любой стадии развития



Срок годности 4 года
 Объем упаковки 10 мл (флакон)
 Действующее вещество 50 г/л эсфенвалерата, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Картофельная моль	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1	7
 НЕПЛОДОНОСЯЩИЕ САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ (саженцы, молодые деревья, не достигшие возраста плодоношения), ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	1-5 л/дерево или куст (зависит от возраста и объема кроны)	1	-




Мухоед®

Незаменимое средство для борьбы с почвенными вредителями на цветочных растениях

- удобен в применении – препарат полностью готов для внесения в почву
- уничтожает личинок и взрослых насекомых
- гранулы препарата равномерно распределяются в почве и постепенно выделяют действующее вещество
- не оказывает отрицательного влияния на растения

Срок годности 3 года
Объём упаковки 10 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ <i>(кроме горшечных)</i>	Почвенные комарики, бороздчатый долгоносик	Внесение на поверхность почвы вокруг растений с последующей заделкой путём рыхления почвы	2-3 г/1 м ²	1

Примечание: 1 чайная ложка препарата соответствует 5 г






Муравьед®

Современное средство
для защиты приусадебных участков
от различных видов муравьёв

- характеризуется высокой контактно-кишечной активностью
- применяется на приусадебных участках, отмостках домов, в щелях между садовыми плитками и т. д.

Срок годности	4 года
Объём упаковки	11 мл, 55 мл (флакон)
Действующее вещество	18,3 % имидаклоприда, ВРК

ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА
 Черные садовые и другие виды синантропных муравьёв	Обработка путей проникновения насекомых в помещения – вдоль порогов, по периметру отмостки строений, щели между садовыми плитками и т. д.	5,5 мл/1 л воды	50-100 мл/1 м ²



Муравьед® №1


Проверенное средство для борьбы с домовыми и садовыми муравьями

- характеризуется высокой контактно-кишечной активностью
- применяется на отмостках домов, фундаментах, порогах террас и других путях проникновения муравьев в помещения
- гибель насекомых наступает за 2-4 дня



НОВИНКА
2024

Срок годности 3 года
Объём упаковки 1 мл (ампула), 10 мл (флакон)
Действующее вещество 600 г/л диазинона, КЭ

ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА
 <p>Черные садовые и другие виды синантропных муравьёв</p>	Обработка путей проникновения насекомых в помещения – вдоль порогов, по периметру отмостки строений, щели между садовыми плитками и т. д.	1 мл/ 10 л воды	10 л/5 м ²





Мухоед®

**Высокоэффективное средство
для борьбы с почвенными вредителями
на овощных культурах**

- удобен в применении – препарат полностью готов для внесения в почву
- уничтожает личинки и взрослых насекомых
- быстро разлагается и не накапливается в почве
- не оказывает отрицательного влияния на растения



Срок годности 3 года
Объём упаковки 25 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАПУСТА (кроме раннеспелых сортов)	Капустные мухи	Внесение на поверхность почвы при высадке рассады с последующей заделкой путём рыхления почвы	40 г/10 м ²	1	60
 ЛУК (кроме лука на перо)	Луковая муха	Внесение на поверхность почвы при высадке луковиц с последующей заделкой путём рыхления почвы	50 г/10 м ²	1	60

Примечание: 1 чайная ложка препарата соответствует 5 г




Пиноцид®

Незаменимый препарат от комплекса вредителей на хвойных растениях

- уничтожает вредителей за 24 часа
- действует на широкий спектр насекомых
- имеет пролонгированное действие
- обладает выраженными системными и контактными свойствами
- высокая активность в широком диапазоне температур



Срок годности	3 года
Объём упаковки	2 мл (пластиковая ампула); 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество	125 г/л альфа-циперметрин + 100 г/л имидаклоприда + 50 г/л клотианидина, СК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ХВОЙНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	Хермесы, тли, щитовки, ложнощитовки, мучнистые червецы, пилильщики, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	0,5-1,5 л/куст <i>(зависит от возраста и типа формирования куста)</i>	1	—
				1-5 л/дерево <i>(зависит от возраста и объёма кроны)</i>	1	—






Профилактин® ЛАЙТ

Эффективный препарат на основе минерального масла для обработки плодовых, ягодных, декоративных культур и винограда ранней весной

- борется с зимующими вредителями на всех стадиях их развития
- действует уже при температуре от +4 °С
- обладает быстрым контактным действием
- подходит для экологического земледелия

Срок годности	2 года
Объём упаковки	1 л (флакон)
Действующее вещество	658 г/л вазелинового масла, ВЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША, АЙВА	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, молей, медяниц, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	1-5 л/дереву (зависит от возраста и объёма кроны)	1	–
 ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	1-5 л/дереву (зависит от возраста и объёма кроны)	1	–
 ВИНОГРАД	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста)	1	–
 СМОРОДИНА	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста)	1	–
 КРЫЖОВНИК	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста)	1	–
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листовёрток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	0,5 л/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формировки куста)	1	–




Провотокс®

Эффективный препарат
для защиты от проволочника

- обладает контактно-кишечным механизмом действия
- характеризуется длительным защитным периодом
- снижает число повреждённых клубней
- не вызывает привыкания у вредителей
- не токсичен для растений в рекомендуемых нормах расхода



Срок годности 3 года
Объём упаковки 40 г, 120 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ <i>(кроме раннеспелых сортов)</i>	Проволочники	Внесение в почву при посадке	40 г/10 м ²	1	-



Скарабей®

Двойной удар по гусеницам!

- содержит два эффективных действующих вещества из разных химических классов
- начинает действовать через 30 минут после обработки
- вызывает гибель вредителей на всех стадиях развития
- имеет дополнительный отпугивающий эффект
- активен даже при высоких температурах



НОВИНКА
2024

Срок годности 2 года
Объём упаковки 4 мл (ампула), 10 мл (флакон)
Действующее вещество 300 г/л дифлубензулон + 88 г/л эсфенвалерат, СЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША, АЙВА	Яблонная плодовая жук, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,07%	3,5-7 мл/10 л воды	1-5 л/дерево <i>(зависит от возраста и объёма кроны)</i>	2	28
 ВИНОГРАД	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,06%	3-6 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	2	28
 КАПУСТА ЦВЕТНАЯ, БЕЛОКОЧАННАЯ	Капустная моль, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации	2-4 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1	21
 КАРТОФЕЛЬ*	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1	30

*зарегистрировано в республике Беларусь





Сэмпай®

Средство для уничтожения гусениц на овощных и плодовых культурах

- вызывает быструю гибель вредителей в течение 0,5-2 ч.
- обладает хорошим отпугивающим эффектом
- уничтожает гусениц на любой стадии развития
- имеется опыт успешного применения против американской бабочки и листовёртки на винограде



Срок годности 4 года
Объём упаковки 5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 50 г/л эсфенвалерата, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодожорка, листовёртка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	от 1 до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта дерева)	1	30
 КАПУСТА	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	30



Табу®

Современный протравитель клубней картофеля от колорадского жука, проволочника и лука-севка от луковой мухи

- обладает выраженной системной активностью, защищая растения на уязвимой стадии проростков и всходов
- имеет длительный период защитного действия
- эффективен вне зависимости от условий окружающей среды

Срок годности 3 года
Объем упаковки 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество 500 г/л имидаклоприда, ВСК



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней перед посадкой	8 мл/1 л воды	1 л/100 кг клубней	1	-
		Опрыскивание дна борозды во время посадки	4 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1	90
 ЛУК-СЕВОК (на репку)	Луковая муха	Обработка лука-севка перед посадкой путем погружения в 0,1% раствор с экспозицией 2 часа	1 мл/1 л воды	1 л/1 кг луковиц	1	-




Табу® ТРИО

Комплексная защита картофеля с антистрессовым эффектом от вредителей и болезней

- используется в виде баковой смеси из трёх препаратов
- применяется путём опрыскивания клубней перед посадкой
- защищает от колорадского жука, проволочника, ризиктониоза (парши) и фузариоза (гнилей) на длительный срок
- повышает урожайность, количество и размер клубней

Срок годности 3 года
Объём упаковки 4 мл + 10 мл + 5 мл (пластиковые ампулы)
Действующее вещество 500 г/л имидаклоприда, ВРК + 75 г/л флудиоксонила, СК + 500 мг/л коллоидного серебра, ВР



КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Предпосадочная обработка клубней для защиты от колорадского жука, проволочника, ризиктониоза и фузариоза	Ампула №1 + Ампула №2 + Ампула №3	500 мл воды	500 мл/50 кг клубней	1




Танрек®

Проверенный временем препарат для борьбы с личинками и взрослыми особями колорадского жука

- обладает системным механизмом действия
- устойчив к смыванию дождём, обеспечивает защиту всех частей растения
- характеризуется длительным защитным периодом
- эффективен при любых температурах



Срок годности 4 года
Объём упаковки 1 мл (ампула); 10 мл, 50 мл, 100 мл (флакон)
Действующее вещество 200 г/л имидаклоприда, ВРК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	РАСХОД	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	1 мл/2-4 л воды	2-4 л/100 м ²	1	20



Танрек®

**Эффективное средство
от тли и белокрылки на овощных, плодовых,
ягодных и цветочных культурах**

- обладает высокой системной активностью, позволяет предотвратить развитие новых поколений вредителей
- устойчив к смыванию дождём
- характеризуется длительным защитным периодом
- эффективен независимо от погодных условий

Срок годности 4 года
Объём упаковки 1,5 мл (ампула); 12 мл (флакон)
Действующее вещество 200 г/л имидаклоприда, ВРК



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Тли	Опрыскивание в период вегетации	3 мл/10 л воды	от 1 до 5 л/дереву <i>(зависит от возраста и объема кроны дерева)</i>	1	7
	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 1 до 5 л/дереву <i>(зависит от возраста и объема кроны дерева)</i>	1	7
 СМОРОДИНА	Тли	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 0,5 до 1 л/куст <i>(зависит от возраста и типа формирования куста)</i>	1	7
 ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ <i>защищённого грунта</i>	Тли, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1	3
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Тли, цикадки, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1	–



Шарпей®

Универсальный быстродействующий препарат от комплекса вредителей

- оказывает мгновенное действие на вредителей – «нокдаун-эффект»
- экономичен благодаря низким нормам расхода
- способен нарушать откладку яиц у взрослых насекомых и питание личинок
- имеет прогрессивную препаративную форму (микроэмульсия), устойчивую к воздействию высоких температур

Срок годности 3 года
Объём упаковки 1,5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 250 г/л циперметрина, МЭ



КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук, картофельная моль	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/3 л воды	до 3 л/100 м ²	2	20
 КАПУСТА	Белянки, совки, моли	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/3 л воды	до 3 л/100 м ²	3	25
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	3 мл/10 л воды	от 1 до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта дерева)	2	20
 ВИНОГРАД	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/10 л воды	от 0,3 до 0,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	3	25
 МОРКОВЬ*	Муха морковная, листоблошки	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/4 л воды	до 4 л/100 м ²	2	20

*зарегистрировано в республике Беларусь





Препараты от болезней

ФУНГИЦИДЫ

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

Бомбер®

Дымовая шашка для обработки погребов и теплиц

- не имеет аналогов, содержит 2 компонента – фунгицид и инсектицид
- активна против болезней (фузариоза, фомоза и др.), вредителей (картофельной моли, клещей, мокриц, кивсяков, трипсов, слизней, муравьев и др.), а также грызунов
- образующийся дым проникает в труднодоступные места

Срок годности 2 года
 Объем упаковки 5 г (шашка)
 Действующее вещество 300 г/кг тиабендазола + 130 г/кг циперметрина, ДШ



ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 <p>ПУСТЫЕ ПОГРЕБА, ПОДВАЛЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ</p>	Возбудители болезней, вредные членистоногие	Фумигация пустых помещений перед закладкой продукции на хранение	5 г (1 шашка)/20 м ³	1
 <p>ПУСТЫЕ ПАРНИКИ И ТЕПЛИЦЫ*</p>	Трипсы, мокрицы, муравьи, возбудители грибных и бактериальных болезней	Фумигация пустых помещений перед посевом семян, посадкой растений	5 г (1 шашка)/20 м ³	1

После обработки выдержать помещение закрытым 3 дня, затем проветривать в течение 2 дней.

*зарегистрировано в республике Беларусь



Бордоская жидкость

Препарат для обработки плодовых и ягодных культур от болезней ранней весной и в период вегетации

- легко применять, достаточно разбавить водой
- защищает от парши, монилиоза, коккомикоза, плодовой гнили и различных пятнистостей
- не вызывает ожогов на растениях

Срок годности	3 года
Объём упаковки	100 мл, 500 мл, 1 л (флакон)
Действующее вещество	172 г/л меди сульфата трёхосновного, ВСК



КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНА, ГРУША	Парша, монилиоз	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса»	250 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и объёма кроны дерева)	1	60
		Опрыскивание в период вегетации: первое – после цветения; последующие – с интервалом в 7 дней	100 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и объёма кроны дерева)	3	38
 СЛИВА, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКОС	Клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз, «Кармашки» слив	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса»	250 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и объёма кроны дерева)	1	60
		Опрыскивание в период вегетации: первое – после цветения; последующие – с интервалом в 7 дней	100 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и объёма кроны дерева)	3	28
 СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ, КРЫЖОВНИК	Септориоз, антракноз, столбчатая ржавчина	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёного конуса»	250 мл/10 л воды	1-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	60
		Опрыскивание в период вегетации: первое – после цветения; последующие – с интервалом в 7 дней	100 мл/10 л воды	1-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	3	смородина – 28 дней, крыжовник – 20 дней



Геката®

Двухкомпонентный препарат для обработки плодовых культур и винограда от комплекса болезней

- обладает защитным и лечащим действием
- характеризуется системными свойствами, равномерно распределяется внутри тканей растения, защищает молодой прирост
- уникальное сочетание действующих веществ эффективно борется с различными болезнями на винограде



Срок годности 3 года
 Объем упаковки 3 мл (ампула)
 Действующее вещество 120 г/л дифеноконазола + 60 г/л тетраконазола, КМЭ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», последующие – с интервалом 7-14 дней	4-7 мл/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объема кроны)	3	60
 ЯБЛОНЯ	Гнили плодов при хранении (монилиозная, пенициллезная, серая плесневидная, фомозная), оливковая плесень, фузариозная гниль	Опрыскивание в период созревания плодов	6 мл/10 л воды	1-5 л/дерево (зависит от возраста и объема кроны)	2	40
 ВИНОГРАД	Оидиум, черная гниль, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: 1-ая обработка – весной в фазе бутонизация – цветение, 2-ая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней	5-7 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	4	30




Здоровая земля®

Комплексный препарат для дезинфекции почвы

- идеальная профилактика развития корневых гнилей
- защищает от заболеваний на длительный срок
- подавляет почвенные инфекции в зоне корней



Срок годности 4 года
 Объём упаковки 50 мл (флакон)
 Действующее вещество 198 г/л тирама + 198 г/л карбоксина, ВСК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 РАССАДА ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ	«Чёрная ножка»	Дезинфекция почвы после высева семян методом полива	2 мл/1 л воды	1 л/0,2 м ²	1	-



Инсайд®

Современный комбинированный препарат от фитофтороза и пероноспороза на овощных культурах

- быстро останавливает развитие болезней, имеет длительный период защитного действия
- отлично подходит для профилактических обработок
- устойчив к смыванию дождем
- надежно защищает все части картофеля, лука и томатов от развития и проникновения инфекций

Срок годности 2 года
 Объем упаковки 10 мл (флакон)
 Действующее вещество 200 г/л диметоморфа + 200 г/л флуазинама, СК



КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе смыкания рядков, последующие – с интервалом 7-10 дней	8-10 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	4	20
 ЛУК РЕПЧАТЫЙ (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней	10 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	3	20
 ВИНОГРАД	Милдью, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое до цветения, последующие с интервалом 10-14 дней	9-12 мл/ 10 л воды	0,5-1 л/куст	3	30
 ТОМАТ (открытого грунта)*	Фитофтороз, альтернариоз	Трехкратное опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе смыкания рядков, последующие – с интервалом 10-14 дней	8-10 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	3	20

*находится в стадии регистрации



Интрада

Мощный препарат от широкого спектра болезней овощных культур и винограда

- обладает высокой скоростью воздействия – 0,5-1 час после применения
- характеризуется длительной защитой до 4 недель
- проникает во все части растения, обеспечивая полный профилактический и лечебный эффект
- подавляет прорастающие споры патогенов
- является аналогом препарата Квадрис

Срок годности 2 года
 Объем упаковки 10 мл (флакон)
 Действующее вещество 250 г/л азоксистробина, СК



НОВИНКА
2024

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения	6-8 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	3	28
	Ризиктониоз, серебристая парша	Опрыскивание клубней и дна борозды при посадке	10 мл/1 л воды	1 л/100 м ²	1	60
 ТОМАТЫ открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней	4-6 мл/6 л воды	6 л/100 м ²	2	10
 ТОМАТЫ защищённого грунта	Фитофтороз, альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней	8-10 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	2	7
 ОГУРЦЫ открытого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-14 дней	4-6 мл/8 л воды	8 л/100 м ²	2	7
 ОГУРЦЫ защищённого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-14 дней	4-6 мл/15 л воды	15 л/100 м ²	2	7
 ЛУК	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней	8-10 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	3	15
 КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ	Ложная мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	8-10 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	2	10
 ВИНОГРАД	Милдью, оидиум	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 10-14 дней	6-8 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	2	35



Ордан®

Незаменимое лекарство от болезней томатов, огурцов и картофеля

- характеризуется уникальным сочетанием двух активных веществ с различным механизмом действия
- обладает профилактическими, защитными и искореняющими свойствами
- не вызывает привыкания у возбудителей инфекций



Срок годности 3 года
 Объем упаковки 12,5 г, 25 г (пакет)
 Действующее вещество 689 г/кг меди хлорокиси + 42 г/кг цимоксанила, СП

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое до смыкания ботвы в рядках или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-14 дней	25 г/5 л воды	5 л/100 м ²	3	20
 ТОМАТЫ открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней	25 г/5 л воды	5 л/100 м ²	3	5
 ТОМАТЫ защищённого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней	25 г/8 л воды	8 л/100 м ²	3	3
 ОГУРЦЫ открытого грунта	Пероноспороз (ложная мучнистая роса)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней	25 г/5 л воды	5 л/100 м ²	3	5
 ОГУРЦЫ защищённого грунта	Пероноспороз (ложная мучнистая роса)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней	25 г/8 л воды	8 л/100 м ²	3	3



Плантенол Нео

Системный препарат с уникальным механизмом действия от болезней плодового сада

- идеально подходит для обработки до цветения при низких положительных температурах
- характеризуется усиленным искореняющим действием при высоких температурах
- обладает системными свойствами, распределяется в тканях листа, обеспечивая полноценную защиту всех частей растения

Срок годности 3 года
 Объем упаковки 3 г (пакет)
 Действующее вещество 500 г/кг ципродинила, ВДГ



НОВИНКА
2024

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША	Парша, монилиоз, альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зелёный конус» – конец цветения с интервалом 7-10 дней	3 г/ 10 л воды	1-5 л/дерево <i>(зависит от возраста и объёма кроны)</i>	2	60
	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое – до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней	3-5 г/ 10 л воды	1-5 л/дерево <i>(зависит от возраста и объёма кроны)</i>	2	5
 ВИШНЯ, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ	Плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая	5 г/ 10 л воды	1-5 л/дерево <i>(зависит от возраста и объёма кроны)</i>	2	5




Побелка садовая

Известное средство
для обработки стволов деревьев

- образует покрытие, предохраняющее стволы от насекомых-вредителей и спор грибов-патогенов
- защищает от солнечных ожогов
- повышает стойкость плодовых деревьев к заморозкам и резким температурным перепадам
- не препятствует естественному воздухообмену

Срок годности	3 года
Объём упаковки	500 г (пакет)
Действующее вещество	природный мел, пленкообразующий компонент (натрий карбоксиметилцеллюлоза), порошок



КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 <p>ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ</p>	Солнечные ожоги, морозобойные трещины	<p>Содержимое упаковки залить 750 мл горячей воды, перемешивать 1-2 минуты, оставить на 4-5 часов, после этого ещё раз перемешать. Приготовленный раствор нанести кистью на обрабатываемую поверхность. При необходимости полученный раствор можно разбавить водой до нужной консистенции.</p> <p><i>Внимание! Перед обработкой стволы взрослых деревьев рекомендуется очистить металлической щеткой от старой, отслоившейся коры</i></p>	500 г/750 мл воды	1-2 дерева (зависит от возраста и сорта)	1-2 (весной или осенью)



Ракурс®

Эффективный препарат от комплекса болезней хвойных и декоративных культур

- содержит уникальную комбинацию двух действующих веществ, характеризующихся различной скоростью проникновения и распределения в растении
- обладает быстрым и сильным профилактическим и лечащим действиями
- имеет пролонгированный защитный период (более 20 дней)



Срок годности 4 года
Объём упаковки 4 мл (пластиковая ампула); 48 мл, 480 мл (флакон)
Действующее вещество 240 г/л эпоксиконазола + 160 г/л ципроконазола, СК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ	Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дерево (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	4	–
	Ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дерево (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	4	–
 ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дерево (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	2-3	–
	Ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дерево (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	4	–
 МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/100 м² (зависит от размера растений)	3	–
 ГРУША*	Ржавчина, парша	Опрыскивание в период вегетации	5-7 мл/10 л воды	2-5 л/дерево (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	4	30

*зарегистрировано в республике Беларусь





Раёк®

Высокоэффективный препарат для обработки плодовых и овощных культур от болезней

- обладает длительным профилактическим и лечащим действием
- быстро проникает в ткани растений и не смывается дождём уже через 2 часа после опрыскивания
- защищает листья и плоды
- не вызывает образования «сетки» на плодах, обеспечивает высокое качество продукции

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	250 г/л дифеноконазола, КЭ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зелёный конус», «розовый бутон», последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней	1,5-2 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	4	20
 КАРТОФЕЛЬ	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней	4 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	2	28
 ТОМАТЫ открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней	4 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	2	28
 КОСТОЧКОВЫЕ ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ*	Коккомикоз, монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации	1,5-2 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	4	30

*зарегистрировано в республике Беларусь



Ракурс®

Комбинированный препарат от комплекса болезней лиственных деревьев и груши

- предотвращает инфицирование, останавливает поражение уже заболевших растений, а также не допускает образование спор
- обеспечивает длительную защиту до 20 дней
- активен даже в холодную и влажную погоду, которая способствует распространению заболеваний

Срок годности 4 года
 Объём упаковки 10 мл (флакон)
 Действующее вещество 240 г/л эпоксиконазола + 160 г/л ципроконазола, СК



НОВИНКА
2024

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ГРУША*	Ржавчина, парша	Опрыскивание в период вегетации	5-7 мл/10 л воды	2-5 л/дереву (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	4	30
 ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дереву (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	2-3	–
	Ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дереву (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	4	–
 ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ	Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дереву (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	4	–
	Ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дереву (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	4	–
 МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/100 м ² (зависит от размера растений)	3	–

*зарегистрировано в республике Беларусь








Реvus®

Системный препарат для защиты овощных культур от болезней

- обладает повышенной дождеустойчивостью, не смывается осадками уже через час после опрыскивания
- характеризуется длительной защитой вновь образующейся ткани листа, благодаря трансламинарному перемещению и лечебной активности
- способствует получению стабильных урожаев
- улучшает показатели хранения

Срок годности	3 года
Объём упаковки	3 мл (пластиковая ампула)
Действующее вещество	250 г/л мандипропамида, КС

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЛУК (репка)	Пероноспороз (ложная мучнистая роса)	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней	1,2 мл/1 л воды	1 л/20 м ²	2	15
 ТОМАТЫ открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней	3 мл/2,5 л воды	2,5 л/50 м ²	4	5
 КАРТОФЕЛЬ	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней	6 мл/5 л воды	5 л/100 м ²	4	5



Садовый вар

Необходимое средство для заживления ран плодовых и декоративных деревьев

- имеет две формы упаковки для удобства использования
- применяется при прививках и обрезке ветвей, а также для заживления ран, в т. ч. от солнечных ожогов



Срок годности	5 лет
Объём упаковки	150 г (туба); 150 г (брикет)
Действующее вещество	<i>туба: мягчитель (петролатум), канифоль, парафин</i>

КУЛЬТУРА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ



ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Отмершие и отставшие от древесины части коры срезать ножом до здоровой древесины, зачистить, продезинфицировать поражённое место раствором медного купороса и при помощи деревянной лопаточки тонким слоем замазать его садовым варом.

При заделке глубоких ран разрешается добавлять в размягчённый вар наполнитель (мел или доломит в соотношении 1:1)



Синклер®

Протравитель картофеля и чеснока перед посадкой и закладкой на хранение

- является аналогом природного антибиотика
- создает защитный экран на поверхности посадочного материала и вокруг него в почве
- обеспечивает устойчивость посадочного материала к заражению патогенами с момента обработки и на срок до 12 недель



Срок годности 3 года
 Объем упаковки 4 мл (пластиковая ампула)
 Действующее вещество 75 г/л флудиоксонила, СК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Ризиктониоз, фузариоз	Обработка клубней перед посадкой	2 мл/ 100 мл воды	100 мл/10 кг	1	–
	Гнили при хранении: фузариозная, фомозная, мокрая бактериальная, альтернариозная	Обработка клубней семенного картофеля перед закладкой на хранение с последующим подсушиванием	2 мл/ 100 мл воды	100 мл/10 кг	1	–
 ЧЕСНОК ОЗИМЫЙ*	Гнили луковок	Замачивание зубков перед посадкой с экспозицией 30 минут с последующей просушкой	2 мл/ 3 л воды	3 л/1 кг зубков	–	–

! Возможно добавление препарата **Табу** в раствор **Синклера** для предпосадочной обработки картофеля от вредителей и болезней
 *зарегистрировано в республике Беларусь



Синклер®

Протравитель посадочного материала цветочных культур от различных заболеваний

- применяется для обработки клубней и клубнелуковиц перед посадкой
- создает защитный экран в почве вокруг растения против гнилей и других инфекций
- не оказывает отрицательного воздействия на полезные микроорганизмы

Срок годности 3 года
 Объем упаковки 1 мл (пластиковая ампула)
 Действующее вещество 75 г/л флудиоксонила, СК



НОВИНКА
2024

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Фузариозная гниль луковиц, альтернариоз, пенициллезная гниль луковиц	Обработка посадочного материала перед посадкой путем погружения в 0,1% рабочий раствор с экспозицией 30 минут и последующим просушиванием	1 мл/1 л воды	1 л/1 кг	1	-
 ГЛАДИОЛУС, ЛИЛИЯ*	Фузариозная гниль	Обработка посадочного материала перед посадкой путем погружения в 0,1% рабочий раствор с экспозицией 30 минут	1 мл/1 л воды	1 л/0,5 кг	-	-
 ИРИС*	Бактериальная и сухая гниль, пятнистости листьев (гетероспориоз)	Обработка посадочного материала перед посадкой путем погружения в 0,1% рабочий раствор с экспозицией 30 минут	1 мл/1 л воды	1 л/0,5 кг	-	-
 ПИОН*	Пятнистости листьев (септориоз), серая гниль	Обработка посадочного материала перед посадкой путем погружения в 0,1% рабочий раствор с экспозицией 30 минут	1 мл/1 л воды	1 л/0,5 кг	-	-

*зарегистрировано в республике Беларусь



Скор®

Системный препарат от болезней плодовых и цветочно-декоративных культур

- обеспечивает профилактическую защиту и выраженное лечебное действие
- проникает в растение в течение 2 часов после обработки и не смывается дождем
- защита препарата длится 14-21 день, в зависимости от степени инфицированности и погодных условий
- имеет гибкие сроки применения

Срок годности 3 года
 Объем упаковки 2 мл (пластиковая ампула)
 Действующее вещество 250 г/л дифеноконазола, КЭ



НОВИНКА
2023

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней	2 мл/ 10 л воды	2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	3	20
 ЯБЛОНЯ	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней	3-3,5 мл/ 10 л воды	2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	2	20
 АБРИКОС, ПЕРСИК, СЛИВА,	Кластероспориоз, курчавость листьев	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней	2 мл/ 10 л воды	2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	2	21
 ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ	Коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней	2 мл/ 10 л воды	2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	2	21



КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее – с интервалом 14 дней	2 мл/ 10 л воды	10 л/100 м ²	2	–
	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее – с интервалом 14 дней	4 мл/ 10 л воды	10 л/100 м ²	2	–
 РОЗА	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее – с интервалом 14 дней	2 мл/ 10 л воды	10 л/100 м ² (до 1 л на растение)	2	–
	Черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее – с интервалом 14 дней	5 мл/ 10 л воды	10 л/100 м ² (до 1 л на растение)	4	–
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее – с интервалом 14 дней	2 мл/ 10 л воды	10 л/100 м ²	2	–
	Пятнистости	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее – с интервалом 14 дней	5 мл/ 10 л воды	10 л/100 м ²	4	–




Топаз®

Специализированный высокоэффективный препарат от мучнистой росы и ржавчины

- обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действиями
- останавливает рост мицелия возбудителя мучнистой росы через 2-3 часа после обработки
- быстро поглощается растениями, что снижает риск смывания дождём

Срок годности 4 года
Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 100 г/л пенконазола, КЭ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 СМОРОДИНА	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания	2 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	4	14
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания	4 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1	–



Хорус®

От монилиоза, коккомикоза
и других болезней плодовых культур

- высокоэффективен при пониженных температурах воздуха, рекомендован к применению ранней весной
- быстро поглощается растением, не смывается дождем
- обладает системным, защитным и лечебным действием
- не вызывает привыкания у возбудителей болезней



Срок годности 3 года
Объем упаковки 2 г (пакет)
Действующее вещество 750 г/кг ципродинила, ВДГ

НОВИНКА
2023

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КОСТОЧКОВЫЕ ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ (персик, слива, абрикос, вишня, черешня)	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое – до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней	2-3,5 г/ 10 л воды	10 л/100 м ²	2	15
	Плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая	3,5 г/ 10 л воды	10 л/100 м ²	2	15
	Кластероспориоз, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая	3,5 г/ 10 л воды	10 л/100 м ²	2	15
 ЯБЛОНЯ, ГРУША	Монилиоз, альтернариоз, мучнистая роса, парша (частичное действие)	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» – конец цветения с интервалом 7-10 дней	2 г/ 10 л воды	10 л/100 м ²	2	28



Чистоцвет®

Эффективное средство для защиты цветочных и декоративных культур от комплекса болезней


- характеризуется длительным профилактическим и выраженным лечебным свойствами
- обладает системным действием и обеспечивает защиту растений до двух недель
- проникает в растения через 2 часа после обработки и не смывается дождём



Срок годности 5 лет
 Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
 Действующее вещество 250 г/л дифеноконазола, КЭ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	2 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	2	–
	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	4 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	2	–
	Пятнистости	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	4 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	4	–
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	2 мл/10 л воды	0,5-1 л/ куст	2	–
	Пятнистости	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	4 мл/10 л воды	0,5-1 л/ куст	4	–





Препараты от сорняков

ГЕРБИЦИДЫ

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

Грейдер®



Мощный гербицид длительного действия против любой растительности

- обладает системными свойствами и выраженной почвенной активностью
- истребляет все виды сорной растительности, а также нежелательные деревья и кустарники
- уничтожает надземную часть сорняков и их корни
- имеет длительный период защитного действия: 1-3 года
- применяется только на участках, не предназначенных под посев

Срок годности	4 года
Объем упаковки	10 мл, 50 мл, 100 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество	250 г/л имазапир, ВГР



НОВИНКА
2023

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ	Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (береза, осина, ольха, сосна, ива, ель)	Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентябре	20-50 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1
 ЗЕМЛИ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (участки, не предназначенные под возделывание культурных растений) И В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ*	Однолетние и многолетние сорняки	Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста	20-25 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1
	Борщевик Сосновского	Опрыскивание при высоте борщевика до 30 см	20-25 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1
	Однолетние и многолетние сорняки, лиственные древесно-кустарниковые породы	Опрыскивание растений в фазу их активного роста	25-50 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1

*зарегистрировано в республике Беларусь

! В рабочий раствор рекомендуется добавление усилителя активности пестицидов **Адюв**




Деймос для газона

Эффективный препарат против широколистных сорняков на газонах

- поддерживает декоративность газонов за счет уничтожения широколистных растений
- эффективно борется с такими сорняками, как одуванчик, клевер, звездчатка средняя (мокрица), марь (виды), осоты, лютик и др.
- действует избирательно, не повреждая газонную траву
- уничтожает сорняки, устойчивые к гербицидам из других химических классов



Срок годности	5 лет
Объем упаковки	10 мл (пластиковая ампула); 40 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество	480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли, ВРК

КУЛЬТУРА	СОРНЯЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ГАЗОНЫ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений	2-5 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1

*! В рабочий раствор рекомендуется добавление усилителя активности пестицидов **Адью***




Деймос ГЕЛЬ

Проверенный препарат в форме геля для точечного уничтожения сорняков

- удобен в применении, наносится на поверхность листа сорного растения и распределяется аппликатором
- уничтожает более 40 видов сорняков, в т. ч. одуванчик, клевер, звездчатку (мокрицу), марь, осоты, лютик и др.
- вызывает гибель сорняков, устойчивых к гербицидам из других химических классов
- имеет высокую скорость проникновения в растения



Срок годности	2 года
Объем упаковки	50 мл (туба)
Действующее вещество	50 г/кг дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ГАЗОНЫ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	<p>Препарат готов к применению.</p> <p>На поверхность листа сорного растения выдавить полоску геля длиной 1 см (0,1 г) и с помощью специального аппликатора распределить гель по поверхности листа</p>	<p>0,1 г /100 см² <i>листовой поверхности</i></p>	1




Деймос

Эффективный препарат для очистки
целинных участков, дорожек и др.
от злостных широколистных сорняков

- уничтожает более 40 видов сорняков, в т. ч. амброзию, осоты, клевер, марь, звездчатку и др.
- вызывает гибель сорняков, устойчивых к гербицидам из других химических классов
- имеет высокую скорость проникновения
- полностью разлагается в почве за период вегетации



Срок годности	5 лет
Объём упаковки	90 мл, 900 мл (флакон)
Действующее вещество	480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли, ВРК

КУЛЬТУРА	СОРНЯЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 <p>УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ ИЛИ ПОСАДКУ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)</p>	<p>Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения</p>	<p>Опрыскивание вегетирующих сорных растений</p>	<p>15-30 мл/3 л воды</p>	<p>3 л/100 м²</p>	<p>1</p>

*! В рабочий раствор рекомендуется добавление усилителя активности пестицидов **Адью**
!! Для сплошного уничтожения сорняков (двудольных и злаковых) рекомендуется совместное применение с гербицидом **Миура***




Деймос + Миура®

Двойной удар по сорнякам!

- уничтожают более 90 видов сорняков
- обладают высокой скоростью проникновения в сорные растения
- полностью разлагаются в почве
- рекомендуются для очистки целинных участков
- применяются путём смешивания двух препаратов



Срок годности	5 лет (Деймос); 5 лет (Миура)
Объём упаковки	45 мл + 12 мл (флаконы)
Действующее вещество	480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли, ВРК + 125 г/л хизалофон-П-этила, КЭ

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 <p>УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ</p>	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	45 мл +12 мл/4,5 л воды	4,5 л/150 м²	1

*! В рабочий раствор рекомендуется добавление усилителя активности пестицидов **Адью***



Миура®

Современный препарат для защиты овощных культур от злаковых сорняков

- эффективно уничтожает пырей, овсюг, плевел и др.
- действует избирательно, не оказывает отрицательного влияния на морковь, лук, капусту, перец, томаты, фасоль и арбуз
- ускоренно поглощается листьями и надземными частями сорняков, переносится к точкам роста побегов и корневищ, способствуя быстрой гибели сорной растительности

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	4 мл (ампула); 12 мл (флакон)
Действующее вещество	125 г/л хизалофоп-П-этила, КЭ



КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, ЛУК ВСЕХ ГЕНЕРАЦИЙ (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые сорняки (виды щитинника, и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев	4 мл/ 5 л воды	5 л/100 м ²	1	60
	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см	8 мл/ 5 л воды	5 л/100 м ²	1	60
 МОРКОВЬ (в том числе для пучкового товара)	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев	4 мл/ 5 л воды	5 л/100 м ²	1	20
	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см	8 мл/ 5 л воды	5 л/100 м ²	1	20
 АРБУЗ*, ФАСОЛЬ*, ТОМАТ* посевной	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев	4-8 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
	Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий)	Опрыскивание при высоте пырея 10-15 см	8-12 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
 ПЕРЕЦ*, ТОМАТ* рассадный	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады	4-8 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады	8-12 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих однолетних сорняков в фазе 2-4 листьев и многолетних сорняков при высоте 10-15 см	8 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	1	-

*находится в стадии регистрации

! В рабочий раствор рекомендуется добавление усилителя активности пестицидов **Адью**




Лазурит®

Незаменимое средство в борьбе с сорняками на картофеле

- уничтожает сорняки в момент их прорастания при довсходовом или в течение 10-20 суток при послевсходовом применении
- обеспечивает надёжную защиту от сорной растительности на протяжении 1-2 месяцев
- не оказывает отрицательного влияния на картофель
- выпускается также в инновационной водорастворимой упаковке



Срок годности	5 лет
Объём упаковки	10 г, 20 г (пакет)
Действующее вещество	700 г/кг метрибузина, СП

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ (кроме раннелетнего)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	10 г/3 л воды	3 л/100 м ²	1	-
		Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см	10 г/3 л воды (первое опрыскивание) 10 г/9 л воды (второе опрыскивание)	3 л/100 м ² 9 л/300 м ²	2	-

! В рабочий раствор рекомендуется добавление усилителя активности пестицидов **Адью**



Лазурит® Т

Драгоценный помощник в борьбе с сорняками на томатах

- применяется для борьбы со многими видами сорных растений
- обладает продолжительным периодом защитного действия
- эффективно подавляет проростки сорняков в почве
- имеет широкий диапазон применения

Срок годности 5 лет
Объём упаковки 5 г (пакет)
Действующее вещество 700 г/кг метрибузина, СП



КУЛЬТУРА	СОРНЯЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТ <i>рассадный</i>	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт	10-12 г/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
		Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт	10 г/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
 ТОМАТ <i>посевной</i>	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры	20 г/10 л воды	3 л/100 м ²	1	60
		Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры	10 г/10 л воды (первое опрыскивание) 10 г/6 л воды (второе опрыскивание)	2 л/100 м ² 3 л/100 м ²	2	60

! В рабочий раствор рекомендуется добавление усилителя активности пестицидов **Адыо**






Лазурит® УЛЬТРА

Умная прополка картофеля и томатов

- создает в почве экран против прорастания сорняков, при этом не повреждает картофель и томаты
- уничтожает амброзию, горцы, звездчатку, марь, мятлик, осот, ромашку, щирицу и множество других сорных растений
- защищает посадки на протяжении 1-2 месяцев
- выпускается в удобной жидкой форме



Срок годности 2 года
Объем упаковки 9 мл (флакон)
Действующее вещество 600 г/л метрибузина, СК

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТ <i>рассадный</i>	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт	13-16 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
		Опрыскивание почвы через 15-20 дней после высадки рассады в грунт	12 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
 ТОМАТ <i>полевой</i>	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры	8 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
		Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры	3 мл/3 л воды (первое опрыскивание) 5 мл/3 л воды (второе опрыскивание)	3 л/100 м ² 3 л/100 м ²	2	60
 КАРТОФЕЛЬ <i>(кроме раннелетнего)</i>	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	8-16 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
		Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см	6-12 мл/3 л воды (первое опрыскивание) 3,5 мл/3 л воды (второе опрыскивание)	3 л/100 м ²	2	60
		Опрыскивание по сорнякам при высоте культуры до 5 см	8-9 мл/3 л воды	3 л/100 м ²	1	60

! В рабочий раствор рекомендуется добавление усилителя активности пестицидов **Адью**





Магнум®

Эффективный препарат от злостных двудольных сорняков, в том числе от борщевика на участках и территориях не предназначенных под посев

- проникает во все части растения, включая корни
- подавляет проростки сорняков в почве
- имеет период защитного действия не менее 6 месяцев
- гибель сорняков наступает через 10-20 дней в зависимости от погодных условий



Срок годности 5 лет
Объем упаковки 2 г, 4 г (пакет)
Действующее вещество 600 г/кг метсульфурон-метила, ВДГ

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 <p>УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ</p>	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих однолетних сорняков в фазе 2-4 листьев, многолетних при высоте 10-15 см	2 г/3 л воды	3 л/100 м ²	1
 <p>ЗЕМЛИ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (участки, не предназначенные под возделывание культурных растений) И В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ*</p>	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. борщевик Сосновского, золотарник канадский и некоторые злаковые	Опрыскивание растений до высоты 30 см	1-3 г/3 л воды	3 л/100 м ²	1

*зарегистрировано в республике Беларусь

! В рабочий раствор рекомендуется добавление усилителя активности пестицидов **Адью**



Хакер®

Избирательный препарат для борьбы с сорняками на газоне

- выпускается в виде гранул, с повышенным содержанием действующего вещества
- легко перемещается по растению, нарушая процесс деления клеток и прекращая его рост
- уничтожает различные виды сорняков, в т. ч. одуванчик, ромашку, бодяк, виды осота, паслён и др.
- подавляет рост сорняков, не повреждая злаковые газонные травы



Срок годности	3 года
Объём упаковки	2,5 г (пакет)
Действующее вещество	750 г/кг клопиралида, ВРГ

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ГАЗОНЫ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (одуванчик, подорожник, щавель, лютик и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков через 1-2 дня после первого укоса	2,5 г/5 л воды	5 л/100 м ²	1

*! В рабочий раствор рекомендуется добавление усилителя активности пестицидов **Адью***



Хакер® 300

Эффективное средство избирательного действия от сорняков на газоне

- обладает системными свойствами, перемещается по растению, прекращая его рост
- уничтожает различные виды сорняков, в т.ч. корнеотпрысковые за 2-3 недели
- не повреждает злаковые газонные травы, землянику, капусту и лук
- удобная в применении жидкая препаративная форма

Срок годности	3 года
Объем упаковки	9 мл, 90 мл, 450 мл (флакон)
Действующее вещество	300 г/л клопираллида, ВР



НОВИНКА
2023

КУЛЬТУРА	СОРНЯЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
ЗЕМЛЯНИКА	Многолетние двудольные (осоты, шавель, дуванчик) и некоторые однолетние сорные растения (виды ромашки, горца)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений после сбора урожая	5-6 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	1	-
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ	Однолетние двудольные и некоторые многолетние сорняки (осот, бодяк)	Опрыскивание посадок после высадки рассады в грунт в фазу розетки у многолетних двудольных сорняков	4 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	1	60
ЛУК*	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание культуры, начиная с фазы двух настоящих листьев. Вторая обработка проводится через 3-4 недели после первой	3 мл/3 л воды (первое опрыскивание) 6 мл/3 л воды (второе опрыскивание)	3 л/100 м ²	2	60
ГАЗОНЫ	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения (подорожник, одуванчик, ромашка, шавель, амброзия, тысячелистник)	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорным растениям после первого укоса	1,6-3,3 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	1	-
ГАЗОНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРТИВНЫЕ**	Однолетние и многолетние двудольные (тысячелистник, полын, клевер, одуванчик, подорожник, люцерна и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков через 3-4 дня после скашивания газона (июнь-август)	5 мл/ 3 л воды	3 л/100 м ²	2	-

*находится в стадии регистрации

**зарегистрировано в республике Беларусь

! В рабочий раствор рекомендуется добавление усилителя активности пестицидов Аджю



Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

Адьювант

УСИЛИТЕЛЬ
АКТИВНОСТИ
ПРЕПАРАТОВ


Адью®

Усилитель активности средств защиты растений и удобрений

- увеличивает проникающую способность препаратов
- предотвращает скатывание капель растворов с растений, листья которых густо опушены или сильно покрыты восковым налётом
- повышает дождестойкость препаратов
- уменьшает степень испарения с листьев при обработке



Срок годности	4 года
Объём упаковки	2 мл (ампула)
Действующее вещество	900 г/л этоксилата изодецилового спирта

НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 <p>СПОСОБСТВУЕТ ЛУЧШЕМУ ПРИЛИПАНИЮ И ПРОНИКНОВЕНИЮ В РАСТЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ</p>	<p>Препарат добавляется в рабочие растворы инсектицидов, гербицидов, фунгицидов, а также удобрений при каждом их использовании</p>	<p>2 мл/3 л рабочего раствора</p>	<p>согласно регламенту применения совместно используемого препарата</p>	<p>согласно регламенту применения совместно используемого препарата</p>



Комплексное удобрение

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО



МикроМикс®

Водорастворимое комплексное бесхлорное удобрение с микроэлементами

- содержит сбалансированный состав элементов питания
- обеспечивает получение высоких урожаев, ускоряет рост и развитие растений
- применяется для подкормки овощных, плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур в комнате, на балконе и даче
- не содержит хлора и тяжёлых металлов

Срок годности 3 года
Объём упаковки 300 г (пакет)
Действующее вещество N – 11%, P – 11%, K – 21%, Mg – 2,5% + микроэлементы

КУЛЬТУРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ КАРТОФЕЛЬ	Подкормка растений через 7-10 дней после посадки (или появления всходов), последующие с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ЛУК И ЧЕСНОК	Корневая подкормка через 7-10 дней после появления всходов, последующие с интервалом 10-15 дней. Полив прекращают за 15-20 дней до уборки	20 г/10 л воды	5-10 л/м²	3-4
 ЯБЛОНИ, ГРУШИ, ВИШНЯ, МАЛИНА, СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК, ЗЕМЛЯНИКА И ДР.	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, последующие – с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ в открытом грунте	Подкормка многолетних растений весной в начале возобновления вегетации, последующие с интервалом 10-15 дней Подкормка растений через 7-10 дней после посадки (или появления всходов), последующие с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Подкормка растений	2 г/1 л воды	до увлажнения земляного кома (корневая подкормка); до увлажнения поверхности листьев (некорневая подкормка)	1 раз/7-10 дней (март – октябрь), 1 раз/месяц (ноябрь – февраль)

Примечание: 15-20 г удобрения соответствуют 1 столовой ложке
 Подробные рекомендации по применению см. на упаковке



Регуляторы роста растений

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО



Корень Супер®

Стимулятор корнеобразования саженцев и черенков плодовых, ягодных, декоративных культур

- способствует ускоренному формированию мощной корневой системы
- повышает приживаемость
- снимает стресс при высадке растений



Срок годности 3 года
 Объем упаковки 5 г, 10 г (пакет)
 Действующее вещество 5 г/кг 4(индол-3ил) масляной кислоты, ВРГ

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (черенки)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Обмакивание предварительно увлажненного нижнего среза черенка	10-20 мг/ черенок		1	-
 ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (саженцы)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Замачивание корневой системы на 6 часов	1 г/1 л воды	1 л/растение	1	-
		Полив под корень через 10 дней после высадки	1 г/1 л воды	0,5 л/растение	1	-



Почкорост®

Цитокининовая паста для увеличения количества цветоносов и обильного цветения орхидей и других цветочных культур

- пробуждает спящие почки
- способствует формированию новых побегов и нескольких цветоносов
- стимулирует образование «деток» на луковичных и клубнелуковичных растениях



Срок годности	3 года
Объём упаковки	1,5 г (пластиковая туба)
Действующее вещество	10 г/кг 6-бензиламинопурина, ПС

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОРХИДЕЯ (все виды)	Пробуждение спящих почек, формирование новых побегов и цветоносов	Нанесение препарата на спящую почку тонким слоем специальным аппликатором	1,5-2 мг/почку	1	-
 ФИАЛКА (сенполия)	Стимуляция цветения	Нанесение препарата на место прикрепления прицветников к цветоносу тонким слоем специальным аппликатором	1,5-2 мг/почку	1	-
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (луковичные, клубнелуковичные)	Пробуждение спящих почек, стимуляция образования «деток»	Нанесение препарата на донце луковицы, клубнелуковицы тонким слоем специальным аппликатором	2 мг/1 шт.	1	-
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (кустарники)	Пробуждение спящих почек, стимуляция образования новых побегов	Нанесение препарата на спящую почку тонким слоем специальным аппликатором с интервалом 10 дней	2 мг/почку	2	-

Для лучшего проникновения препарата острым предметом (нож, лезвие, игла и др.) с места обработки осторожно снять эпидермис и нанести пасту тонким слоем специальным аппликатором (удлиненным носиком полимерной тубы)








Рэгги®

Регулятор роста растений от перерастания рассады и образования усов у земляники

- предотвращает «вытягивание» рассады
- формирует у рассады мощные корни и крепкие стебли
- уменьшает количество усов у земляники
- улучшает декоративность цветов
- активизирует образование корневой системы и обеспечивает густоту травостоя у газона



Срок годности	4 года
Объём упаковки	1 мл (пластиковая ампула)
Действующее вещество	750 г/л хлормекватхлорида, ВРК

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТ, ПЕРЕЦ (рассада)	Активизация формирования корневой системы, предотвращение перерастания рассады, улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2-е и 3-е – с интервалом 5-8 дней	1 мл/ 1 л воды	300 мл/10 м²	3	–
		Полив растений под корень в фазе 3-4 листьев	1 мл / 1 л воды	30 мл/растение (3 л/1 м²)	1	–
 КАПУСТА (рассада)	Активизация формирования корневой системы, предотвращение перерастания рассады, улучшение качества рассады, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – в фазе семядольных листьев, 2-й и 3-й – с интервалом 7 дней	3 мл/ 1 л воды	1 л/1 м²	3	–
 ЗЕМЛЯНИКА	Повышение устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды, уменьшение отрастания побегов (усов), увеличение количества ягод, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в начале фазы бутонизации, 2-е – через 7 дней после первого опрыскивания	10 мл/ 1 л воды	300 мл/10 м²	2	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (горшечные растения)	Активизация формирования корневой системы, снижение высоты растений, формирование компактного куста, повышение декоративных качеств, продление периода цветения	Полив растений: 1-й – в фазе сформированных, но ещё не окрашенных бутонов, 2-й – через 5-6 месяцев после первого полива	1 мл/ 100 мл воды	50-100 мл/растение	2	–
 ТРАВЫ ГАЗОННЫЕ	Предотвращение быстрого перерастания, активизация формирования корневой системы, увеличение густоты стояния травостоя	Опрыскивание растений: 1-е – после первого скашивания травы; 2-е и 3-е – с интервалом 20-25 дней (после скашивания травы)	5-10 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	3	–






Трафик®

Регулятор роста против прорастания лука и картофеля во время хранения

- подавляет образование проростков на срок до 9 месяцев
- проявляет активное действие уже через 24 часа после обработки
- применяется путём опрыскивания растений в период вегетации за 14-25 дней до сбора урожая
- повышает устойчивость картофеля и лука к болезням при хранении

Срок годности	2 года
Объём упаковки	3 мл (ампула)
Действующее вещество	270 г/л малинового гидразида (калиевая соль), ВРК



КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЛУК РЕПЧАТЫЙ (на репку)	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении луковиц	Опрыскивание растений за 14-21 день до сбора урожая (при полегании – не более 50%)	3 мл/ 75-100 мл воды	75-100 мл/ 3 м²	1
 КАРТОФЕЛЬ	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении клубней	Опрыскивание растений за 21-25 дней до сбора урожая (при размере сформировавшихся клубней не менее 25 мм)	3 мл/ 60-75 мл воды	60-75 мл/ 2-3 м²	1

Использовать луковички и картофель в пищу можно через 60 дней после обработки.



Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

Серия «БАУ»

Препараты полностью
готовые к применению





Биотлин® БАУ

Готовый к применению препарат от тли на овощных и ягодных культурах

- уничтожает тлю и тепличную белокрылку уже через несколько часов после опрыскивания
- имеет длительный защитный период, благодаря системному действию

Срок годности	2 года
Объём упаковки	700 мл (флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество	0,1 г/л имидаклоприда, ВР

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОГУРЕЦ И ТОМАТ <i>защищённого грунта</i>	Тли, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/7 м²	1	1
 СМОРОДИНА <i>(все виды)</i>	Тли	Опрыскивание до цветения	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/1,5-7 кустов (зависит от размеров куста)	1	7
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/35 м²	1	20






Цветолюкс® БАУ

Готовый к применению препарат от тли, трипсов, белокрылки на цветочных и декоративных культурах

- защищает от сосущих вредителей уже через несколько часов после опрыскивания
- благодаря системному действию, предотвращает появление новых поколений вредителей

Срок годности	2 года
Объём упаковки	700 мл (флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество	0,1 г/л имидаклоприда, ВР

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ открытого и защищённого грунта	Тли, трипсы, цикадки, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	Разбавление водой не требуется	700 мл/7 м ²	2
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Тли, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	Разбавление водой не требуется	700 мл/1,5-7 кустов	2
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Тли, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	Разбавление водой не требуется	700 мл/0,5-1 дерево	2





Чистоцвет® БАУ


Готовый к применению препарат от комплекса болезней цветочных и декоративных культур

- защищает в течение 4-5 недель после обработки
- не токсичен для растений
- не смывается дождём уже через 2 часа после опрыскивания

Срок годности	3 года
Объём упаковки	700 мл (флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество	0,7 г/л пропиконазола, ВР

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ открытого грунта	Мучнистая роса, ржавчина, пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/7-28 растений (зависит от размеров растения)	1
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Мучнистая роса, пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/1-7 кустов (зависит от размеров куста)	1
 РОЗЫ	Чёрная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней	<i>Разбавление водой не требуется</i>	700 мл/7-14 растений (зависит от размеров растения)	2





Серия
«Двойная защита»
НАБОРЫ ИЗ ДВУХ ПРЕПАРАТОВ

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

«Двойная защита»

профессионально защитит ваши растения!

АО Фирма «Август» предлагает серию препаратов «Двойная защита», которая создана специально для комплексной обработки плодовых, ягодных, цветочных и декоративных культур. В каждой упаковке содержатся **два наиболее эффективных препарата**, один из которых предназначен для борьбы с вредителями, второй – для лечения и профилактики болезней.



Чистоцвет + Биотлин

Защита цветов от мучнистой росы, пятнистостей и от трипсов, цикадок, тли



Раёк + Биотлин

Защита сада от парши, мучнистой росы и от тли, цветоеда




Топаз + Биотлин

Защита смородины от мучнистой росы, ржавчины и от всех видов тли



• Выгодная покупка • Комплексное решение •



Препараты от грызунов РОДЕНТИЦИДЫ

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

Super-CAT®

avgust crop protection


Super-CAT®

Готовые приманки от грызунов


- обладают высокой родентицидной активностью
- смертельная доза может быть получена грызунами в результате однократного поедания приманки
- вызывают 100% гибель крыс и 90% гибель мышей в течение 4-8 суток
- уничтожают даже чувствительных и устойчивых к другим антикоагулянтам грызунов



Срок годности	3 года
Объём упаковки	100 г (пакет, мягкие брикеты); 48 г (пакет, твёрдые брикеты)
Действующее вещество	0,005% бромадиолонa

ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 КРЫСЫ, ДОМОВЫЕ МЫШИ, ПОЛЁВКИ	<p>Приманку (твёрдые брикеты/мягкие брикеты) помещают в небольшие ёмкости, специальные контейнеры, на подложки из плотной бумаги, полиэтилена, пластика и раскладывают в местах обитания крыс и домашних мышей.</p> <p>В помещениях ёмкости с приманкой размещают на путях перемещения грызунов и прежде всего в углах, вдоль стен и перегородок, под мебелью, вблизи нор.</p>	<p>20 г/лоток (мыши), 50 г/лоток (крысы)</p> <p><i>Расстояние между местами раскладки от 1 до 5 м (зависит от площади помещений, а также вида и численности грызунов)</i></p>	<p>Приманку восполняют по мере поедания.</p> <p>При высокой численности грызунов приманку раскладывают часто и небольшими порциями</p>





Серия «Мир без вредителей»

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

МИР БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Надёжная защита дома и приусадебного участка от широкого спектра насекомых и вредителей

- от иксодовых клещей
- от клопов
- от комаров и гнуса
- от тараканов, чешуйниц, мокриц
- от домовых и садовых муравьёв
- от слизи и улиток
- от кротов
- от ос





Клещевит® Супер

Для очистки территорий от иксодовых клещей

- применяется на приусадебных, дачных и садовых участках, в том числе на участках, располагающихся рядом с лесом
- начинает действовать уже через 30 минут после обработки
- защищает на срок 1-1,5 месяца
- малотоксичен для птиц и дождевых червей, не представляет опасности для почвенных микроорганизмов

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 100 мл (флакон)
 Действующее вещество: 25% циперметрина

Клещевит® Супер СПРЕЙ

Для обработки одежды от иксодовых клещей, блох

- отлично подходит для защиты от насекомых во время отдыха на природе, прогулок по лесу
- не просто отпугивает, а уничтожает насекомых
- защитное действие – до 15 суток

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 100 мл (флакон)
 Действующее вещество: 0,25% альфациперметрина



Комароед®

От комаров, их личинок и других видов гнуса

- применяется путём опрыскивания мест посадки и днёвки насекомых: стены подвалов, сараев, низкие кусты, прибрежная растительность, непроточные непитьевые водоёмы, которые не используются для полива и купания, искусственные прудики
- эффективно снижает популяцию различных видов гнуса

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 100 мл (флакон)
 Действующее вещество: 25% циперметрина



Комароед® Супер

АЭРОЗОЛЬ

От кровососущих насекомых (комаров, мошек, слепней, клещей и др.)

- применяется против насекомых во время отдыха на природе, прогулок в лесу
- можно наносить на одежду и на кожу
- защищает не менее 4-х часов

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 125 мл (флакон)
 Действующее вещество: 36% N,N диэтилтолуамида



Кукарача®

От тараканов, чешуйниц и мокриц

- применяется на кухнях, в комнатах, ваннах, подвалах и подсобных помещениях
- содержит пищевые привлекатели
- действует по принципу «эпидемии» – насекомые, после соприкосновения с гранулами, переносят препарат на других особей, вызывая гибель всей колонии
- насекомые погибают через 2–3 суток
- гранулированная форма для размещения на подложках

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 50 г (пакет)
 Действующее вещество: 0,5% хлорпирифоса

Кукарача® ПРИМАНКА

От всех видов тараканов

- применяется в квартирах и других помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие насекомых
- действует по принципу «эпидемии» – насекомые, после контакта с приманкой, переносят препарат на других особей, вызывая гибель всей колонии
- насекомые погибают через 2–3 суток
- защищает на длительный срок
- удобная для применения форма в виде пластиковых ловушек

Срок годности: 5 лет
 Объём упаковки: 1,5 г x 4 шт (контейнер)
 Действующее вещество: 0,5% хлорпирифоса

Кукарача® ГЕЛЬ

От тараканов, чешуйниц и мокриц

- не имеет запаха
- содержит пищевые привлекатели для насекомых
- удобный носик тубы позволяет наносить гель в труднодоступные места
- обладает продолжительным действием, благодаря длительному высыханию геля
- содержит краситель в составе для маркировки обработанных мест
- остатки препарата легко удаляются при помощи влажной ткани

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 30 мл (туба)
 Действующее вещество: 0,5% имидаклоприда



Кукарача® СПРЕЙ

От тараканов, чешуйниц и мокриц

- применяется на кухнях, в комнатах, ваннах, подвалах и подсобных помещениях
- действует мгновенно: гибель насекомых наступает в течение часа
- отсутствует привыкание у насекомых

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 100 мл (флакон)
 Действующее вещество: 0,1% альфациперметрина, 0,1% тетраметрина

Кротомет® ДЫМОВАЯ ШАШКА

От кротов

- выделяемый шашкой сернистый диоксид проникает в норы кротов, их ответвления и галереи, полностью изгоняя вредителей с обрабатываемого участка
- удобный фитиль-спичка, обеспечивает задержку начала горения и выделения дыма
- имеет длительное последствие: 2-3 месяца

Срок годности: 3 года
 Действующее вещество: 32% серы



Клопоед®

Для уничтожения постельных клопов и других насекомых

- используется для обработки мест обитания клопов: щели в стенах, полу и мебели, за плинтусами, подоконники, обратные стороны картин, ковров, места отхождения обоев и т. д.
- не имеет сильного запаха
- гибель насекомых наступает на 2 день после обработки
- гарантирует длительный (около месяца) защитный эффект
- отсутствует привыкание у насекомых

Срок годности: 4 года
 Объём упаковки: 100 мл (флакон)
 Действующее вещество: 18,2% имидаклоприда





Муравьед® Супер

От садовых и домовых муравьёв

- применяется на садовых участках, отмостках домов, садовых дорожках и в помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие муравьёв
- проникает сквозь внешнюю оболочку муравьёв и разрушает импульсы, идущие от нервных узлов к мышцам, вызывая у насекомых паралич
- действует по принципу «эпидемии» – муравьи приносят приманку в муравейник, что вызывает гибель всей колонии
- защищает на длительный срок

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 50 г (пакет); 120 г, 240 г (банка)
 Действующее вещество: 0,5% хлорпирифоса



Муравьед® Супер

ПРИМАНКА

От рыжих домовых и садовых муравьёв

- применяется в местах скопления насекомых
- содержит пищевые добавки, привлекающие муравьёв
- действует по принципу «эпидемии» – муравьи приносят приманку в муравейник, что вызывает гибель всей колонии
- насекомые гибнут на 1–3 сутки
- защищает на длительный срок
- удобная для применения форма в виде пластиковых ловушек

Срок годности: 5 лет
 Объём упаковки: 1,5 г x 4 шт (контейнер)
 Действующее вещество: 0,5% хлорпирифоса

Муравьед[®] Супер ГЕЛЬ

От садовых и домовых муравьёв

- не имеет запаха
- содержит улучшенные пищевые привлекатели для муравьёв
- удобный носик тубы позволяет наносить гель в труднодоступные места
- обладает продолжительным действием, благодаря длительному высыханию геля
- содержит краситель в составе для маркировки обработанных мест, который легко удаляется при помощи влажной ткани

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 30 мл (туба)
 Действующее вещество: 0,5% имидаклоприда



Мухоед[®] Супер

От всех видов мух

- применяется для уничтожения мух в помещениях, таких как летние кухни, террасы, беседки и др., а также на фермах
- насекомые погибают в течение нескольких минут после контакта со средством
- содержит пищевые добавки, привлекающие насекомых
- можно использовать в виде пасты для обработки оконных рам и плафонов

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 10 г (пакет)
 Действующее вещество: 0,4% азаметифоса





Мухоед[®] Супер

ЛИПКАЯ ЛЕНТА

От всех видов мух

- безопасное средство для любых помещений
- работает до двух месяцев
- обладает длительным фиксирующим свойством

Срок годности: 5 лет
 Объём упаковки: 1 лента в гильзе, 100 шт. в коробке
 Действующее вещество: клеевая композиция

Осоед[®] ГЕЛЬ

От ос и различных видов мух

- не имеет запаха
- содержит пищевые привлекатели для насекомых
- удобный носик тубы позволяет наносить гель в труднодоступные места
- обладает продолжительным действием, благодаря длительному высыханию геля
- содержит краситель в составе для маркировки обработанных мест
- остатки препарата легко удаляются при помощи влажной ткани

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 30 мл (туба)
 Действующее вещество: 0,5% имидаклоприда





Инсекта®

**Для уничтожения летающих
и ползающих насекомых**

- обладает высокой скоростью воздействия
- не имеет сильного запаха
- малоопасен для человека и млекопитающих
- не вызывает привыкания у насекомых

Срок годности: 4 года
 Объём упаковки: 100 мл
 Действующее вещество: 18,1% имидаклоприда



Слизнед® Нео

От слизней и улиток

- применяется путем посева гранул на приманочных площадках в междурядьях и на дорожках
- обладает высокой эффективностью и длительным защитным действием
- помогает избежать снижения урожайности и потери товарного вида продукции

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 14 г, 28 г, 56 г, 98 г (пакет), 294 г (банка)
 Действующее вещество: 30 г/кг метальдегида

Ципершок®

От летающих и ползающих насекомых

- обладает острым инсектицидным действием
- характеризуется длительной защитой 1 – 1,5 месяца
- уничтожает тараканов, клопов, муравьев, блох, мух, комаров, в том числе личинок



Срок годности: 3 года
 Объем упаковки: 50 мл (флакон)
 Действующее вещество: 26,32% циперметрина

Insecta® АЭРОЗОЛЬ
















От комплекса летающих и ползающих насекомых


- удобная форма в виде аэрозоля
- обладает мгновенным действием
- не оставляет пятен на коврах и мебели
- действует на широкий спектр вредителей, таких как тараканы, муравьи, блохи, клопы, мухи, бабочки моли, сверчки, мокрицы, уховёртки, чешуйницы



Срок годности: 3 года
 Объем упаковки: 220 мл, 750 мл (флакон)
 Действующее вещество: 0,25% циперметрина, 0,12% тетраметрина

**МИР БЕЗ
ВРЕДИТЕЛЕЙ**

															
Insecta® АЭРОЗОЛЬ	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Инсекта® ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ	✓			✓	✓	✓	✓						✓		
Клещевит® Супер КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ			✓												
Клещевит® Супер СПРЕЙ	✓		✓												
Клопоед® ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ	✓			✓	✓	✓	✓							✓	
Комароед® КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ					✓										
Комароед® Супер АЭРОЗОЛЬ			✓	✓											
Кротомет® ДЫМОВАЯ ШАШКА															✓
Кукарача® ГРАНУЛЫ		✓						✓	ЛИ				✓	КИ	
Кукарача® ПРИМАНКА					УС				ЛИ				✓	ТИ	
Кукарача® ГЕЛЬ		✓			УС			✓	МО				✓	ЛИ	
Кукарача® СПРЕЙ	✓	✓		✓	УС	✓	✓	✓	МО	✓	✓	✓	✓	ЛИ	✓
Муравьед® Супер ГРАНУЛЫ		Ц			Г	✓							Н	У	
Муравьед® Супер ПРИМАНКА		И			Г	✓			Ц	И			Н	У	
Муравьед® Супер ГЕЛЬ		И			Р	✓			Ц	И			Н	У	
Мухоед® Супер ГРАНУЛЫ	И	И	И	И	И	И	✓	И	И	И	И	И	И	И	И
Мухоед® Супер ЛИПКАЯ ЛЕНТА	Х	У	Щ	П	А	В	✓	Р	О	Р	В		А	З	Т
Осоед® ГЕЛЬ	Л	Ш	Е	Л	О	М	✓	К	Б	Е	Х	О	✓	А	Р
Слизнеед® Нео ГРАНУЛЫ	Л	Е	Л	Л	О	У	✓	У	О	К	Б	В	Х	О	✓
Ципершок® КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ	✓	Ч	К	✓	✓	✓	✓	М	Б	С	У	О	✓	С	К



Серия «Мир без вредителей» марки ЭКО

Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

МИР БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЭКО

Специальная серия препаратов бытовой химии и репеллентов марки ЭКО разработана для надёжной защиты дома и приусадебного участка от насекомых и вредителей

В неё входят средства:

- от домашних и садовых муравьёв
- от тараканов
- от комаров
- от кротов
- от змей



Оглавление

Алфавитный
указатель

Рекомендации
садоводам

БИО
земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы
роста

БАУ

Двойная
защита

Родентициды

Бытовая
химия

Бытовая
химия ЭКО

Змеед® ЭКО ШАРИКИ



Эффективное средство для отпугивания змей

- безопасно для людей, домашних животных и окружающей среды
- обладает репеллентным эффектом
- 100% натуральный состав
- полностью биологически разлагаемо
- содержит уникальную комбинацию отпугивающих запахов

Срок годности:

3 года

Объём упаковки:

50 шариков

Действующее вещество:

комбинация эфирных масел 5%



Кротомет®



Биоразлагаемые гранулы для отпугивания кротов

- удобная для применения упаковка
- не токсичен для человека и теплокровных животных
- не опасен для пчёл
- не загрязняет окружающую среду

Срок годности:

1 год

Объём упаковки:

75 г (пакет), 400 г (банка)

Действующее вещество:

150 г/кг Allium sativum, Г

Комароед® БИО

От личинок комаров

- применяется путем обработки мест выплода комаров: прудов, канав, непересыхающих луж, бочек и других ёмкостей с водой, а также затопленных подвалов
- не вызывает загрязнения окружающей среды, не накапливается в растениях
- безопасен для человека и теплокровных



Срок годности: 2 года
Объём упаковки: 15 г (пакет)
Действующее вещество: комплекс содержащий бактерии *Bacillus thuringiensis var. israelensis*

Кукарача® ЭКО

Для уничтожения тараканов

- применяется в местах скопления насекомых: квартирах, кухнях, комнатах и других помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие тараканов
- воздействует на нервную систему насекомого, вызывает паралич, приводя его к гибели
- уничтожает тараканов за 5-7 суток
- не имеет запаха
- безопасен для человека и млекопитающих



Срок годности: 2 года
Объём упаковки: 50 г (пакет); 120 г (банка)
Действующее вещество: 5% борной кислоты

Муравьед® ЭКО

От садовых и домовых муравьёв

- применяется в коттеджах, на отмостках домов, террасах, верандах, в ваннах, душевых и других помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие муравьёв
- воздействует на нервную систему насекомого, вызывает паралич, приводя его к гибели
- уничтожает муравьёв за 2-3 суток
- не имеет запаха
- безопасен для человека и млекопитающих

Срок годности:

2 года

Объём упаковки:

50 г (пакет); 120 г (банка)

Действующее вещество:

5% борной кислоты



**МИР БЕЗ
ВРЕДИТЕЛЕЙ**



Змеед® ЭКО
ШАРИКИ

Кротомет®
ГРАНУЛЫ

Комароед БИО®
ПОРОШОК

Кукарача® ЭКО
ГРАНУЛЫ

Муравьед® ЭКО
ГРАНУЛЫ

КОМАРЫ, ГНУС

МУРАВЬИ

ТАРАКАНЫ

КРОТЫ

ЗМЕИ



Оглавление

Алфавитный указатель

Рекомендации садоводам

БИО земледелие

Инсектициды

Фунгициды

Гербициды

Адьювант

Удобрение

Регуляторы роста

БАУ

Двойная защита

Родентициды

Бытовая химия

Бытовая химия ЭКО

С нами расти легче

Мы неустанно идём в ногу со временем и стараемся жить на одной волне с нашими потребителями. Именно поэтому мы, совершенствуясь, создаем условия для получения полной информации о препарате, его пользе, нормах применения и исследованиях.

Для поддержки потребителей мы создали **телефонную горячую линию**

Многоканальный телефон справочной службы
(бесплатно по России)
8-800-700-03-57

Для просмотра видеоинструкций или роликов подписывайтесь на youtube.com/avgustdacha



Для быстрого получения полной информации о препарате мы стали размещать на упаковке **QR-code**. Найдите его, наведите камеру телефона с доступом в интернет или отсканируйте его с помощью специального приложения и перейдите на страницу препарата на нашем сайте



Заходите на наш сайт:

dacha.avgust.com

Также, мы представлены здесь:

Вконтакте vk.com/avgustdacha

Telegram t.me/avgustdacha

Одноклассники ok.ru/avgustdacha

Яндекс Дзен zen.yandex.ru/avgust_dacha



БИОГЕРБИЦИД НА ОСНОВЕ ПЕЛАРГОНОВОЙ КИСЛОТЫ



525 г/л пеларгоновой кислоты

Контактный препарат от мха, лишайников и нежелательной травянистой растительности

- Полное и быстрое уничтожение тех частей растения, на которые был нанесен
- Обладает высокой скоростью разложения в почве, безопасен для человека и окружающей среды
- Применяется для очистки газонов, садовых дорожек, отмосток и др.





**МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
(БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ):
8-800-700-03-57**

ОФИС: 129515, РОССИЯ,
Г. МОСКВА, УЛ. ЦАНДЕРА, Д. 6,
ТЕЛ.: (495) 787-84-99

DACHA.AVGUST.COM

