

Норма расхода карбамида при проведении подкормок рассады:

Культура	Норма расхода (г на 10 л воды)		
	1 подкормка	2 подкормка	3 подкормка
Капуста ранняя и цветная	15	20	—
Томат, перец, баклажан	3,5	4	7
Огурец, кабачок, тыква	—	9	—
Лук репчатый и лук-порей	—	15	—

1-я подкормка — образование 2-3 настоящего листа или 10-12 дней после пикировки

2-я подкормка — через 10 дней после первой;

3-я подкормка — за 2 недели до высадки рассады в грунт.

Норма карбамида при основном внесении для овощей:

Культура	До посева (или посадки)		После посева (или посадки) — подкормка			
	Срок внесения и способ заделки	Доза карбамида		Срок внесения и способ заделки	г/м ²	Доза карбамида
		г/м ²	мерка			мерка
Картофель	Весной под перекопку	15	1 спичечный коробок	Если не внесено до посева, то при появлении всходов под междурядное рыхление и окучивание	15	1 спичечный коробок
Капуста белокочанная	Перед высадкой рассады с заделкой в почву	22-26	2 столовые ложки	Перед формированием кочана под прополку и окучивание	7	1,5 чайной ложки
Свекла столовая	Перед посевом с заделкой в почву	11-17	1 спичечный коробок	При появлении 1-2 настоящих листьев под прополку или рыхление	4	1 чайная ложка
				В начале формирования корнеплода под прополку или рыхление	4	1 чайная ложка
Морковь	Перед посевом с заделкой в почву	11-15	1 спичечный коробок	Через 2-3 недели после всходов под прополку или рыхление	3	1 чайная ложка (без верха)
Огурцы	Перед посевом с заделкой в почву	9-12	1 столовая ложка	Через 2-3 недели после посева под прополку или рыхление	4	1 чайная ложка
				В начале цветения под прополку или рыхление	3	1 чайная ложка (без верха)

Томаты	Перед посадкой рассады с заделкой в почву	11-15	1 спичечный коробок	Через 10-15 дней после посадки рассады под прополку и окучивание	3	1 чайная ложка (без верха)
				В начале завязывания плодов	7	1,5 чайной ложки
Лук репчатый	Перед посевом с заделкой в почву	11-15	1 спичечный коробок	Через месяц после посадки севок под прополку или рыхление	4	1 чайная ложка
				В период интенсивного роста растений под прополку или рыхление	4	1 чайная ложка

Нормы внесения карбамида под плодово-ягодные культуры:

Культура	Срок внесения и способ заделки	Норма	
		г/м ²	мерка
Плодовые культуры Плодоносящие деревья	Рано весной в фазе интенсивного роста корней и побегов с заделкой в почву	9	1 столовая ложка (без верха) на 1 м ² приствольного круга
(семечковые и косточковые)	После цветения с заделкой в почву	5	1 чайная ложка (с верхом)
	Осенью после уборки урожая с заделкой в почву	5	1 чайная ложка (с верхом)
<i>Примечание</i> — некорневую обработку проводят опрыскиванием спустя 8-10 дней после цветения: для яблони используют 0,4 — 0,5 % раствор карбамида, груши — 0,2 — 0,25 % раствор, сливы — 0,6 — 0,8 % раствор, вишни — 0,4 — 0,8 % раствор. Лучшее время опрыскивания — утро или вечер, а также в пасмурную погоду днем.			
Смородина и крыжовник	Рано весной под рыхление почвы	20	2 столовые ложки (без верха)
<i>Примечание</i> 9в год внесения органических удобрений минеральные не применяют			
Малина	Рано весной под рыхление почвы	20	2 столовые ложки (без верха)
Земляника	На второй год после сбора ягод под прополку и рыхление	7	1,5 чайной ложки
	На третий и последующие годы под рыхление почвы	7	1,5 чайной ложки