

ОПТИМАЛЬНЫЕ ДОЗЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ПОЧВУ

Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное бесхлорное порошкообразное «МАКСИФЕРТ» используется на различных почвах под сельскохозяйственные культуры. Однократное внесение.

Рекомендуемые дозы внесения:

Культура	Норма расхода препарата, г/м ²	Способ и сроки внесения, ограничения по применению
Салат, петрушка, укроп	27-43	В основное внесение, перед севом. Вразброс вручную по поверхности почвы.
Столовые корнеплоды (морковь столовая и свекла столовая)	40-47	В основное внесение, перед севом. Вразброс вручную по поверхности почвы.
Земляника садовая	40	Разбросной. Под перекопку перед посадкой или ранней весной по посадкам с заделкой в почву.
Картофель	53-80	В основное внесение, перед посадкой. Вразброс вручную по поверхности почвы.
Огурец открытого грунта	47-60.	В основное внесение, перед посевом. Вразброс вручную по поверхности почвы.
Фруктовые семечковые	40	Разбросной. Под перекопку перед посадкой или ранней весной в приствольные круги с заделкой в почву.
Пасленовые овощные культуры открытого грунта (томат и перец открытого грунта)	40-47	В основное внесение, перед высадкой рассады. Вразброс вручную по поверхности почвы.
Капуста	73-100	В основное внесение, перед севом или высадкой рассады. Вразброс вручную по поверхности почвы.
Лук (различные виды), чеснок	33-47	В основное внесение, перед севом. Вразброс вручную по поверхности почвы.
Фруктовые косточковые	40	Разбросной. Под перекопку перед посадкой или ранней весной в приствольные круги с заделкой в почву.
Ягодные культуры	265 г/10 м ²	Внесение в прикорневую зону посадок в начале возобновления вегетации
Голубика	40	Разбросной. Под перекопку перед посадкой или ранней весной под куст с заделкой в почву.
Комнатные растения	3 г/л почвогрунта	Прикорневое внесение с последующим тщательным перемешиванием. Внесение в почвогрунт при посадке или пересадке растений.

1 чайная ложка вмещает 3 г удобрения.

1 столовая ложка вмещает 10 г .