


УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
ООО «Дилинс-М»  
В. А. Уласевич  
«30» \_\_\_\_\_ 2010 г



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению средства чистящего  
Б-1 гель с отбеливающим эффектом

Начальник производства ООО "Дилинс-М"  
А.М.Лазарев  
30.11.2010 г



2010 г

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства чистящего Б-1 гель с отбеливающим эффектом

## 1 Общие сведения

1.1 Средство представляет собой водный раствор щелочей, синтетических анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) и активных добавок.

1.2 Состав: менее 5% - АПАВ, ЭДТА, гидроксид натрия; 15% или более, но менее 30% - гипохлорит натрия; 30% и более - вода очищенная.

1.3 Токсиколого-гигиеническая характеристика средств.

1.3.1 Компоненты, входящие в состав средства, гостированы и изучены в токсиколого-гигиеническом плане, на них установлены гигиенические регламенты в воздухе рабочей зоны.

1.3.2 Исходя из процентного содержания и токсикологических характеристик компонентов средство относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

1.3.3 В условиях повторного эпикутанного воздействия средство вызывает раздражение кожных покровов.

## 2 Область применения

2.1 Средство предназначено для применения в быту и на предприятиях торговли, общественного питания, промышленности, на коммунальных объектах, в учреждениях социальной сферы, в детских дошкольных учреждениях и учебных заведениях, в организациях здравоохранения.

## 3 Назначение средства

3.1 Предназначено для очистки ванн, раковин, кафеля, пола, мусорных ведер, посуды, а также для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей и удаления пятен.

## 4 Способ применения

4.1 Очистка с применением средства производится ручным (орошение, погружение, протирание, замачивание) или автоматизированным способом. Средство применяется в виде нативного (готового к применению) раствора или приготавливаются рабочие растворы.

4.2 Для очистки любых щелочестойких поверхностей, унитазов, ванн, кафельной плитки, посуды, инвентаря и тары нанести средство (5-10 мл на 10 см<sup>2</sup>) на загрязненную поверхность, смыть водой через 10-15 мин, при необходимости повторить. Для очистки полов, ламината, линолеума использовать раствор средства 5-10 мл на 1000 мл воды.

4.3 Для отбеливания тканей: замочить белье в 0,2% растворе средства (20 мл на 10 л воды) при температуре от +30°C до +45 °C, выдержать 20-40 минут, затем прополоскать и стирать обычным способом. Средство пригодно к использованию в стиральных машинах: температурный режим от +30°C до +45 °C, время стирки 30 - 40 минут, норма расхода средства 20-30 мл на 4-5 кг белья.

## 5 Меры предосторожности

5.1 К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица с аллергическими заболеваниями, имеющими индивидуальную непереносимость компонентов состава средства.

5.2 При применении средства или приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания средства в глаза или на кожу, для защиты рук использовать резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

5.3 После проведения очистки необходимо вымыть руки с мылом.

5.4 Курить, пить, принимать пищу во время применения средства категорически запрещается.

## 6 Первая помощь при случайных отравлениях

6.1 При случайном попадании в желудок рекомендуется обильное питье.

6.2 В случае появления клинических симптомов отравления – слабость, головокружение, тошнота, рвота, боль в эпигастрии – немедленно обратиться к врачу.

6.3 При попадании средства или рабочего раствора в глаза следует немедленно тщательно промыть их большим количеством проточной питьевой воды в течение 10-15 мин., затем закапать 30% раствор сульфацила натрия. В случае сохранения в течение длительного времени резкой боли, слезоточения, выраженного отека и покраснения век и конъюнктивы – обратиться к врачу.

6.4 При попадании средства или рабочего раствора на кожу – смыть большим количеством воды с мылом, одежду снять.

6.5 При применении средства или рабочего раствора методом орошения без защиты органов дыхания возможно раздражение органов дыхания (горький вкус во рту, першение в горле, кашель, слезотечение, затрудненное дыхание). Пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье. При значительной выраженности симптомов – обратиться к врачу.